



ALLO, DOCTEUR...

Quoi de neuf?

“Docteur, Cyrille a la bouche de travers et je comprends mal ce qu’il me dit”.

Il est 17h, ce mardi de fin d’été, je suis en consultation; au bout du fil, la voix de la maman est affolée mais précise. Après quelques questions complémentaires, je lui demande de se rendre sans délai à l’hôpital.

POURQUOI TANT DE PRÉCIPITATION?



Tique femelle gorgée de sang

Parce qu’il est logique de songer à la maladie de Lyme, transmise par les tiques, de plus en plus nombreuses dans nos contrées ardennaises, et de plus en plus porteuses de cette maladie (+/- 30 % de risque d’être infecté). Mais sûrement pas à une paralysie partielle de la face en rapport avec la morsure de tique du jour-même. L’hospitalisation révélera que l’enfant était bien atteint d’une maladie de Lyme au stade 2, résultant d’une morsure bien antérieure, passée inaperçue. Heureusement, un traitement par antibiotiques administrés par voie intraveineuse a permis une guérison sans séquelle.

La maladie de Lyme est une zoonose (= maladie transmise par des animaux): une tique, en général une nymphe au dos brun-noir, se fixe durant 3-4 jours (morsure indolore) sur la peau, se gorge de sang, et, ensuite, se laisse tomber. **1° conseil:** en région suspecte (actuellement une grande partie de la Wallonie), les promeneurs dans les bois ou les prairies humides, au printemps et en été, devront donc bien veiller à porter des pantalons longs et des vêtements fermant aux poignets; au retour, un examen minutieux des humains, et de leurs chiens! s’avère indispensable. Quand y penser? Devant la tique encore présente, il faut redouter une maladie de Lyme, mais, après l’avoir ôtée délicatement, **2° conseil:** avec une pince à tiques (en vente dans les pharmacies) ET NON en usant de vinaigre, alcool, éther, pince à épiler, ... il est raisonnable d’attendre l’apparition d’une rougeur, de 3 à 33!! jours plus tard, qui grandit lentement en périphérie en pâlisant en son centre, avec ou sans démangeaison ou sensation de brûlure, avec ou sans fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, fièvre et/ou ganglions +/- nombreux (stade1). Une seule attitude: **3° conseil:** consulter votre médecin de famille; il connaît la suite de la mise au point et le traitement.

Et le stade 2? Parfois, ni la morsure, ni la présence de la tique, ni le cercle rouge n’ont été remarqués. Soudainement ou sournoisement, peuvent survenir une éruption ressemblant à la rougeur décrite au stade 1 et/ou des céphalées et/ou de la photophobie (le patient recherche l’obscurité) et/ou des douleurs au niveau des muscles et/ou des tendons et/ou des os et/ou des articulations. Après plusieurs semaines ou mois d’évolution, la situation empire: méningisme, somnolence, troubles de l’humeur, parésie faciale, uni- ou bilatérale, névrite optique, palpitations, syncopes, .. bref de nombreux signes et symptômes assez peu spécifiques d’une maladie en particulier. Et ... **4° conseil:** l’importance de bien signaler à votre médecin traitant si vous êtes un coureur des bois, un naturaliste, un jardinier impénitent, ... Surtout que cette maladie se soigne bien mais en prenant correctement les antibiotiques prescrits.



Tique mâle