

Le dernier hiver, marqué par des conditions climatiques extrêmement rudes, a entraîné l'apparition de nombreux oiseaux nordiques dont la présence est très inhabituelle en Europe occidentale.

Fort heureusement, notre belle région en a également bénéficié, pour le plus grand plaisir des ornithologues: Buses pattues, Mésanges à longue queue à tête blanche, Bruant lapon, Linottes à bec jaune... Ces espèces, et d'autres un peu plus régulières, ont ainsi animé l'actualité ornithologique hivernale!

Voici un petit aperçu de quelques unes des espèces emblématiques qui ont été observées cet hiver dans notre région.

LA BUSE PATTUE (*Buteo lagopus*)

D'ordinaire très irrégulière sous nos latitudes, la Buse pattue y réalise parfois des invasions spectaculaires, lorsque des dizaines d'oiseaux hivernent au sud-ouest de leur aire d'hivernage habituelle. Alors rares sont les mentions en Wallonie de plus de 2 ou 3 oiseaux au cours d'un hiver, l'hiver 1986-1987 nous avait amené la dernière invasion: plus de 60 individus avaient été recensés, dont un dans la plaine agricole de Salles, près de Chimay. Depuis, l'espèce n'avait plus été observée dans notre région...

Cet hiver, plusieurs oiseaux ont été repérés: à Roly, dans les champs de Thuillies-Cour-sur-Heure, aux Barrages de l'Eau d'Heure ainsi que dans la plaine agricole de Bieure (Matagne). Ce dernier oiseau, découvert le 6 mars, a séjourné jusqu'au 24 avril, partageant ses terrains de chasse avec le Busard Saint-Martin et nos Buses variables locales, toutes occupées par leur période de nidification!



Buse pattue lors de sa découverte à Matagne (*Buteo lagopus*)

Houspillée par une corneille
©JF Pinget



L'espèce se reproduit principalement dans la Taïga, cette vaste étendue composée de tourbières à perte de vue, bordant le cercle polaire.

La Buse pattue ressemble comme deux gouttes d'eau à notre Buse variable... Elle s'en distingue entre autre par sa queue blanche bordée d'une barre terminale foncée bien nette, dessous et dessus (pas de dégradé progressif comme chez notre buse variable) ; par une tache sombre près de l'articulation antérieure de l'aile; par ses tarses emplumés.

LE BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*)

Comme son nom l'indique, le Bruant lapon nous vient lui aussi du grand nord. L'hiver, ce gros bruant ne fait que rarement des incursions à l'intérieur des terres. Il est plus commun le long du littoral, où l'observation de groupes de quelques dizaines d'oiseaux est régulière. Plusieurs ont été observés dans la région de Florennes. L'un d'eux a même séjourné une dizaine de jours, en compagnie d'un groupe de 500 Bruants jaunes.



Le Bruant lapon ayant séjourné une dizaine de jours à Hemptinne - premier séjour de l'espèce en ESM © Hugues Dufourny

LA MÉSANGE À LONGUE QUEUE À TÊTE BLANCHE

(*Aegithalos caudatus caudatus*)

Il s'agit de la sous espèce orientale de la Mésange à longue queue, exceptionnelle en Europe occidentale... Dès l'automne, les ornithologues wallons ont décelé l'arrivée d'un

grand nombre de ces oiseaux, un phénomène sans précédent! Notre région n'a pas échappé à cette invasion, avec quelques oiseaux repérés à Vergnies, Matagne-la-Petite et Philippeville.

Ici aussi l'identification est affaire de spécialiste, car il n'est pas rare d'observer des oiseaux ouest-européens avec la tête blanche!

Cette sous-espèce se distingue de la nôtre par:

- une tête blanche immaculée.
- une délimitation nette entre le dos noir et de la tête blanche au niveau du cou
- des bordures blanches très larges aux plumes de l'aile
- le dessous du corps blanc pur et les flancs rosés



La première Mésange à longue queue à tête blanche observée le 15 novembre 2010 en ESM (© Hugues Dufourny)

Arnaud LAUDELOUT

