

# MON JARDIN, C'EST MA NATURE...

## Multipliez aisément quelques arbres et arbustes



Jacques Adriaensen



Utilisez toujours des outils bien aiguisés

Vous souhaitez favoriser la vie sauvage dans votre jardin, à la faveur de nouvelles plantations? Le moyen le plus courant est le semis de graines récoltées soi-même ou achetées dans le commerce. J'en parlerai plus en détail dans un prochain numéro de la revue.

Mais l'hiver, c'est la saison des tailles, notamment des arbres et arbustes caducs comme le saule, le rosier, le buddleia, ...et aussi les petits fruits comme les groseilliers et cassisiers. Profitez de cette taille pour récupérer les rameaux et faire des boutures dites de "bois sec"<sup>1</sup>. C'est un mode de multiplication gratuit et le plus souvent efficace.

Quelques espèces comme les saules ou les peupliers s'enracinent rapidement, et des boutures "de tête"<sup>2</sup> de 30 à 50 cm peuvent être pla-



On prépare les boutures avec précision et soin

cées telles quelles directement en pleine-terre, par exemple dans un coin du potager, ou immédiatement à sa place définitive.

Mais la plupart des ligneux à feuilles caduques<sup>3</sup> ont un enracinement plus lent, et il faut alors respecter une procédure plus précise. Vous trouverez la liste des végétaux concernés ici en fin d'article.

### UNE MÉTHODE SIMPLE

**1.** On commence par prélever, de préférence en début d'hiver, des boutures de tête de 15 à 20 cm sur des tiges vigoureuses et saines. On les prépare en les coupant bien net, à l'aide d'un sécateur, ou mieux, un couteau parfaitement aiguisé. La partie supérieure est coupée en biseau un rien au-dessus d'un œil<sup>4</sup> (ou une paire d'yeux), et la partie inférieure juste sous un œil.

**2.** Les boutures de même espèce ainsi préparées sont liées en petits fagots, et placées tout l'hiver "en jauge" (c.à.d. en attente), enfoncées aux 3/4 dans du sable de rivière, à la verticale, dans un endroit bien drainé, de préférence orienté vers le Nord. N'oubliez pas de les étiqueter lisiblement.



On place les bottes en jauge pour passer l'hiver

**3.** Au début du printemps, on les place en ligne, dans une terre légère, espacées de 10-15 cm. Seul l'œil supérieur doit dépasser hors de terre. Il convient de bien tasser la terre autour des boutures, et d'arroser copieusement et régulièrement.



Au début du printemps, on les place en ligne, dans une terre légère, espacées de 10-15 cm

**4.** Il n'y a plus qu'à attendre l'automne, ceci non sans surveiller attentivement l'humidité du sol ! Il va de soi que le terrain ne peut être envahi par les plantes "indésirables", qui feraient une trop rude concurrence aux fragiles boutures. Pour ce faire, un paillis<sup>5</sup> léger est recommandé entre les rangs. L'apparition des racines assurera la reprise d'une certaine proportion de plants, variable suivant l'espèce et la qualité de votre suivi.

**5.** Enfin, l'automne venu, on pourra procéder à la transplantation des jeunes plants enracinés à leur emplacement définitif.



Ne jamais sous-estimer l'importance de l'arrosage

• **Quelques végétaux à enracinement rapide:** les saules (Salix), les peupliers (Populus), les cassisiers et les groseilliers à fruits ou à fleurs (Ribes).

• **... à enracinement plus lent:**

les rosiers sauvages ou d'ornement (Rosa), le cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), le cornouiller mâle (Cornus mas), le troène sauvage (Ligustrum vulgare) ou d'ornement (L. ovalifolium), les chèvrefeuilles (Lonicera), les sureaux (Sambucus niger et S. racemosa), les viornes (Viburnum) et les Symphorines (Symphoricarpos).

• **... plus difficile à réussir:**

le fusain d'Europe ou "bonnet de prêtre" (Euonymus europaeus)



On trouve dans le commerce d'excellents matériaux pour le paillis

• **Quelques arbustes d'ornement:**

Deutzia, Forsythia, seringat (Philadelphus), Weigelia, hortensia (Hydrangea), vigne vierge (Parthenocissus), Hibiscus syriacus, Kerria et Tamarix.

Jacques Adriaensen

1. "De bois sec" signifie tout simplement qu'elles sont prélevées à un moment de l'année où la sève est "descendue"

2. La bouture "de tête" désigne un fragment de tige prélevé au sommet d'une pousse de l'année.

3. Ligneux à feuilles caduques: plantes qui ont la consistance du bois, et qui perdent leurs feuilles en automne.

4. Œil: endroit de la tige où se trouve un bourgeon naissant, caractérisé au minimum par une petite marque en relief.

5. Paillis: couverture provisoire du sol, ici à base d'écorces finement broyées, de copeaux de bois, de déchets de tonte non tassés, de cosse de sarrasin ou de paillettes de chanvre.