

La Grièche

La feuille de contact de la Cellule Ornithologique
du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse
N°14 – Février 2009

SOMMAIRE

La « Grièche » s'encode en ligne...	p. 1
La Chronique sept. à nov. 2008	p. 3
Hérons garde-boeufs en ESEM	p. 26
Migration du Pluvier guignard	p. 32
Le calendrier des oiseaux	p. 37
Une infinie douceur	p. 42
La Limoselle	p. 45



Cercles des Naturalistes
de Belgique asbl



COMITÉ DE RÉDACTION : PHILIPPE DEFLORENNE, THIERRY DEWITTE, FANNY ELLIS, MARC LAMBERT, ARNAUD LAUDELOUT, OLIVIER ROBERFROID, SÉBASTIEN PIERRET

LA « GRIÈCHE » S'ENCODE EN LIGNE...

Merci à toutes les personnes qui nous envoient régulièrement des observations mais aussi des textes et des photos. Sans elles, ces chroniques n'existeraient pas. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne vous donne qu'un seul conseil : continuez ! C'est toujours un grand plaisir pour nous de faire paraître vos découvertes.

Pour les observations, nous préconisons fortement notre fichier d'encodage, cela nous facilite énormément le travail laborieux de consolidation des données. Si vous ne le possédez pas, n'hésitez pas à me le demander. Mieux encore est l'emploi du nouveau logiciel d'encodage en ligne mis au point par Natagora-Aves. Le lien à consulter est : <http://observations.be/>. Très facile d'utilisation, il est hautement souhaitable que chaque personne encode toutes ses données dans ce logiciel. Cela permet à chaque observateur de connaître, en temps réel, toute l'actualité ornithologique belge ou régionale. De cette manière aussi, les données sont sauvegardées dans la base centrale Aves. En ce qui concerne notre cellule ornithologique, nous récupérons toutes les données régionales à intervalles réguliers, ce qui nous permettra de continuer la rédaction de votre feuille de chou préférée ☺. Si vous le souhaitez encore, certaines données confidentielles peuvent être masquées un temps déterminé. Je vous invite donc à vous rendre sur ce site et à y faire vos premiers pas si ce n'est déjà fait.

Un seul bémol, veuillez continuer à nous envoyer vos photos. Celles-ci ne sont pas publiées sans l'autorisation des auteurs, elles ne sont donc pas prélevées sur le site observations.be.

Pour rappel :

- L'adresse d'envoi pour les données et les textes est philippedeflorenne@yahoo.fr ou par courrier postal: 53 rue de Martinsart à 6440 Froidchapelle.
- Pour les photos, prière de les envoyer à Sébastien Carbonnelle à l'adresse suivante (**attention nouvelle adresse!**) : sebastien.carbonnelle@tele2allin.be

• Si vous ne possédez pas d'ordinateur, vous pouvez recevoir « La Grièche » en format papier. Vous pouvez l'obtenir auprès de Thierry Dewitte à l'adresse suivante : chaussée de Givet, 21 à 5660 Mariembourg.

• Vous pouvez également retrouver les différents numéros sur les deux sites suivants : www.natagora.be/coaesm et www.aquascope.be

Merci d'envoyer vos observations pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009 pour le **15 mars** au plus tard !

Bonne lecture,

Philippe DEFLORENNE



Appel à collaboration



De la part de Christophe Dehem :

Une enquête **Pie-grièche grise** est actuellement en cours en France. Les recherches ont débuté en 2008, notamment en Lorraine, en Franche Comté, en Picardie, en Normandie et en Auvergne. Les autres régions encore occupées par l'espèce (Nord-Pas de Calais, Champagne-Ardenne...) seront prospectées en 2009. Les premiers résultats montrent un recul de l'espèce : des 1700-5500 couples estimés en 1992-1993 pour l'ensemble du pays, il en resterait au maximum 2000 aujourd'hui. Dans un tel contexte, et vu la situation de l'espèce dans les pays voisins, la population wallonne (estimée à 270-330 couples par l'atlas) a acquis une certaine importance au niveau de l'Europe occidentale.

Il est important pour tout observateur de l'ESEM de signaler tout contact avec l'espèce et d'assurer éventuellement un suivi de nidification si tel est le cas. Pour rappel, le nombre de couples nicheurs dans l'ESEM se compte sur les doigts d'une main...

De la part de Denis Van der Elst :

Merci de prêter une attention toute particulière à cette espèce discrète et de nous transmettre vos données. (Attention, le meilleur critère reste le cri ou le chant!!!)

Je voudrais faire un appel aux observateurs Entre Sambre et Meuse motivés par le **Grimpereau des bois**. Si lors de notre Atlas nous avons pu constater une sérieuse avancée en Fagne et Famenne et l'occupation d'avant-postes dans le Condroz jusqu'au sillon Sambro-mosan, de plus en plus d'indices donnent à croire que l'espèce poursuit son extension vers l'Ouest et le Nord. Il y a notamment des publications relatant des chanteurs dans le forêt de Meerdael, au sud de Louvain. Serait-il possible que vous recherchiez sa présence dans les grands bois du nord de votre région ?

LA CHRONIQUE

SEPTEMBRE 2008 – NOVEMBRE 2008

Au niveau météorologique, l'automne 2008 n'est pas marqué d'éléments majeurs. Un temps, en général, assez maussade. Le ciel est souvent gris.

La saison est évidemment caractérisée par les migrations, mais aussi par les premiers hivernants. Parmi ceux-ci, certaines présences sont particulièrement appréciées comme celle du Grand Butor à Virelles où au moins 3 ex. vont s'installer après plusieurs années de présence discrète. Virelles offrira aussi plusieurs Panures à moustaches ou encore une longue présence de 8 Fuligules milouinans.

Au niveau des raretés, on notera la présence du Pipit à gorge rousse à Hemptinne ou encore du Héron garde-bœuf aux BEH.

Et puis, cette saison est encore marquée par beaucoup d'autres choses...



*BEH : Barrages de l'Eau d'Heure
ESEM : Entre-Sambre-et-Meuse*

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : Renseigné comme à l'habitude sur les 3 grands complexes humides régionaux : BEH, Roly et Virelles, le petit grèbe ne sera observé (1 adulte et 2 « grands » jeunes) qu'à un autre endroit, la sablière de Saint-Aubin, le 1^{er} septembre. Cette nichée avait déjà été observée en août, cette sablière serait donc aussi un site de nidification pour cette espèce qui semble augmenter sa population dans notre pays. Pour les maxima, 48 individus ont été notés aux BEH lors du recensement du 15 novembre.

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : A Virelles, les effectifs ne dépassent pas les 15 individus contre 13 à Roly. Aux BEH, c'est jusqu'à 152 ex. en septembre et 132 ex. en octobre et même 195 ex. en novembre qui seront dénombrés. Bref, des chiffres honorables, mais dans la moyenne au vu des années antérieures...

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*) : Hormis un ex. à Virelles le 6 septembre, c'est en novembre et aux BEH que ce grèbe, habituellement considéré comme migrateur, a pu être admiré. Maximum 3 ex. dès la 2^e décade...

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : L'amorce migratoire d'août s'intensifie progressivement pour atteindre notamment les 180 ex. à Virelles le 24 septembre. Des déplacements en octobre encore, avec, entre autre, un groupe de 114 individus à Jamagne le 4. Le 11 octobre, les comptages simultanés au dortoir nous donnent encore un total régional de 273 « cormos » : 138 ex. aux BEH, 70 ex. à Roly et 65 ex. à Virelles. Un groupe de 60 individus est renseigné en migration active le 07/11 à Couvin. Pour l'anecdote, épinglons l'individu porteur d'une bague verte estampillée 3L2 et son compère, porteur d'une bague blanche 6U0, surnommés les Danois, notés chaque hiver aux BEH depuis 2003 et qui entament ainsi leur 6^e hivernage consécutif dans le sud de l'ESEM...



Grands Cormorans, Virelles, le 11/09/08. Photo : Jean-Yves Scohy.



*Butor étoilé, Virelles, le 18/10/08.
Photo : Philippe Deflorenne.*

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) : 13 données en provenance de Virelles, dont au moins 3 individus présents les 18 et 19 novembre, cela faisait longtemps que la grande roselière n'était parue aussi accueillante au bœuf des marais !! La 1^{ère} mention date du 11/10 où un individu semble apprécier la hausse du niveau d'eau ayant à moitié noyé l'ensemble de la phragmitaie...

Le 18/10, deux oiseaux se livrent un combat acharné. Un des deux individus monte sur l'autre, dans l'eau, à la manière d'un accouplement de canards. Il lui assène quelques violents coups de bec, crête hérissée. On peut croire qu'il essaie de le noyer mais cela ne dure pas. Ensuite, bizarrement le "gagnant" rentre dans la roselière et le "perdant" reste sur place.

Le 22 novembre, c'est encore au moins 2 individus qui se prélassent en bordure d'étang. Un hivernage complet sur le site n'est donc pas à exclure...

Rien par contre en provenance de Roly... Manque d'observation ou pas, toujours est-il que Roly sort souvent son épingle du jeu dès que les gelées se font régulières et fortes... Nous verrons donc ce qu'il en est dans notre prochaine chronique...

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : Cet Ardeïde de taille moyenne semble asseoir définitivement son statut d'espèce assez commune. Si pas pour l'ensemble de la zone étudiée, tout du moins pour le site de l'étang de Virelles qui est le seul plan d'eau à retenir le bel oiseau blanc... Les données estivales de la précédente édition sont donc confirmées en début d'automne : courant septembre, c'est jusqu'à 4 ex. qui seront remarqués se nourrissant en bordure d'étang. Le caractère méditerranéen de l'espèce obligera comme d'habitude ces oiseaux à quitter le site dès le 3 octobre. Notons pour terminer que les actions d'abattage d'arbres entreprises cet automne sur l'île boisée à Virelles pourraient créer les conditions buissonnantes *ad hoc* en vue de l'installation prochaine de l'un ou l'autre couple...

Grande Aigrette (*Egretta alba*) : La star régionale!! Si pas la plus répandue, du moins la plus remarquée des espèces présentes en automne : 123 mentions ! C'est fin septembre que les effectifs seront les plus abondants

avec jusqu'à minimum 57 Grandes Aigrettes comptabilisées à Virelles le 26. A Roly, si le peu de données semblent avant tout dû à une absence de comptage, il est quand même fait mention de 43 ex. le 11 novembre... Aux BEH, c'est 1 voire exceptionnellement 2 oiseaux qui seront notés. Ailleurs, c'est-à-dire : Neuville, Forges, Doische, Couvin, Dailly, Fagnolle, Villers-en-Fagne, Mariembourg, Macon, Gonrioux,... nous avons à faire, le plus souvent, à un individu esseulé se nourrissant en prairie.



Grande Aigrette, Virelles, le 21/09/08. Photo: Jean-Yves Schohy.

Héron cendré (*Ardea cinerea*) : Renseigné un peu partout, seul ou en petits nombres. Il en va tout autrement aux abords des grands plans d'eau qui accueillent des dizaines d'individus ; 60 à Virelles en septembre, 17 toujours à Virelles en novembre et jusqu'à 21 exemplaires en décembre au BEH.



Héron cendré bagué, Virelles, le 21/09/08. Photo : Jean-Yves Schohy.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : Septembre marque déjà la fin des départs post-nuptiaux pour ce migrateur précoce: 2 ex. le 7 à Fagnolle, 1 ex. le 11 à Jamagne, 1 ex. les 13 et 14 à Virelles, 3 ex. à Clermont-lez-Walcourt et 1 ex. à Viroinval le 14. La donnée du 21/10 au Ry de Rome à Couvin est à considérer comme relativement tardive.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : Ce bel échassier est renseigné dans 3 localités de la zone étudiée : Florennes (1 ex. le 01/09), Vaulx puis Virelles (1 ex. le 01/09) et Clermont-lez-Walcourt (5 ex. le 11/09). En limite nord de l'Entre-Sambre-et-Meuse, des données nous sont aussi parvenues, notamment en provenance de Merbes-le-Château où un impressionnant groupe de 44 ex. est posé dans un labour le 1er septembre.

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) : Le cygne à bec orangé n'est déclaré que sur nos 3 grands plans d'eau avec des densités ne dépassant pas les 23 individus (Virelles, le 04/10).

Cygne noir (*Cygnus atratus*) : Une seule observation pour cet exotique que l'on rencontre ici et là sur quelques plans d'eau de Wallonie : 1 ex. le 20/10 à Virelles.

Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*) : Roly n'est malheureusement plus "Le" site wallon pour l'hivernage de cette fabuleuse espèce... Les changements culturels dans les plaines des alentours sont sans doute la cause majeure de ce changement que l'on sentait venir depuis quelques années... Quoiqu'il en soit, des données quand même : les premières en provenance de Roly le 24 novembre où 2 adultes sont observés. Un champ de colza à Erpion servira aussi de base de repli pour 2 autres adultes...

Oie cendrée (*Anser anser*) : Comme pour 2007, seule oie grise à être observée cet automne dans notre région... 8 données réparties sur 5 localités ; Florennes, Virelles, BEH (pour un total de 100 migrateurs le 17/11), Clermont-lez-Walcourt et Saint-Aubin.

Bernache du Canada (*Branta canadensis*) : Les mentions provenant d'un peu partout, nous retiendrons les maxima : jusqu'à 162 ex. au dortoir à Virelles, une centaine aux BEH et à Roly.

Bernache nonnette (*Branta leucopsis*) : Contrairement à sa cousine du Canada, la nonnette ne semble pas voir ses populations augmenter de façon exponentielle : seulement 1 individu à Virelles le 04/10 et 1 (autre ?) ex. aux BEH le 28/11. Dans les 2 cas, l'oiseau était en compagnie de Bernaches du Canada.

Ouette d'Égypte (*Alopochen aegyptiacus*) : 17 ex. sont recensés aux BEH le 02/10 et 22 le 13/11. Quelques individus sont signalés à Jamagne, Saint-Aubin, Mariembourg, Hemptinne, Virelles et Yves-Gomezée. L'espèce ne semble nullement souffrir d'être si loin des tropiques.

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*) : 1 individu, échappé de captivité, est observé à Virelles, le 06/11.

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : 4 ex. sont présents à Virelles les 18 et 19/11. Aucune autre mention pour l'espèce durant la période.

Canard mandarin (*Aix galericulata*) : Un juvénile séjourne à Virelles lors de la première moitié du mois de septembre.

Canard siffleur (*Anas penelope*) : Ce canard brouteur est timidement présent sur nos trois plans d'eau principaux en début de période, mais ses rangs s'épaississent au fil du temps. C'est ainsi que 4 ex. sont vus à Roly le 25/11, 15 à Virelles le 09/11 et 10 aux BEH le 28/11. L'année précédente, à la même période, il y avait de 50 à 65 individus sur les mêmes plans d'eau !

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) : Forte diminution par rapport à l'an passé chez notre canard le plus commun. Les maxima montent à 493, aux BEH, le 15/11 et à 170, à Virelles, le 16/11. L'augmentation des effectifs est à peine perceptible durant la période. Par exemple, à Yves-Gomezée, on dénombre 192 ex. le 07/09, 127 le 19/10 et 162 le 16/11.

Canard pilet (*Anas acuta*) : 2 ex. de ce magnifique canard à la queue effilée sont recensés à Virelles le 04/10, ils seront 7 le 15/10. Aux BEH, c'est à la mi-novembre qu'il fait son apparition avec 2 ex. les 13 et 16/11.

Canard chipeau (*Anas strepera*) : Aux BEH comme à Virelles, c'est en petits nombres que l'on observe ce canard en début de période. Mais dès la mi octobre, les chiffres grimpent et c'est ainsi qu'on en dénombre 48 à Virelles le 15/10, 32 aux BEH le 02/11, 73 le 14/11 et 82 le 28/11. Outre ces deux plans d'eau, le Canard chipeau est également observé à Roly (2 ex. le 15/11) et à Yves-Gomezée (3 ex. le 16/11).

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) : Le plus petit de nos canards affiche une présence normale aux BEH avec une vingtaine d'individus dès la mi septembre pour atteindre la quarantaine à la fin novembre. Par contre, à Virelles, les effectifs atteignent un pic à la fin septembre pour diminuer radicalement par la suite : 20 le 02/09, 66 le 06/09, 151 le 25/09, 19 le 18/10, 14 le 16/11 et 2 le 30/11. En dehors de ces deux plans d'eau, la sarcelle est occasionnellement observée ailleurs : 2 ex. le 03/09 à Jamagne, 4 ex. le 15/11 à Roly et 3 ex. le 22/11 à Fagnolle.

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) : C'est en tout début de période que les derniers individus se montrent encore avant de partir vers le Sud. Les derniers aperçus à Virelles seront au nombre de 3 le 06/09 et de 2 le 05/09 aux BEH.

Canard souchet (*Anas clypeata*) : La présence du Canard souchet est stable à Virelles durant la période, mais elle chute à la fin : 45 ex. le 02/09, 39 ex. le 25/09, 45 le 29/10, 67 le 19/11 et 16 le 29/11. Aux BEH, les chiffres sont plus variables, mais l'endroit bien plus difficile à prospecter aussi : 1 ex. le 11/09, 3 le 23/09, 46 le 18/10, 6 le 23/10, 5 le 02/11, 16 le 17/11 et 3 le 30/11. Il n'est observé à Roly qu'en novembre, de 16 ex. le 08/11, on y passe à 55 le 24/11.

Fuligule milouin (*Aythya ferina*) : Comme d'habitude, c'est à Virelles que le Fuligule milouin est le plus observé. On y passe de 314 ex. le 06/09 à 334 le 25/09, 405 le 20/10 et 691 le 16/11. Aux BEH, sa présence est nettement plus discrète : 1 le 05/09, 5 le 02/10, 18 le 17/11 et 24 le 28/11. Il est également présent à Yves-Gomezée où 2 ex. sont observés le 07/09 ainsi qu'à Roly où 6 ex. sont remarqués le 28/11.

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*) : Dès le 25/10, un individu est repéré à Virelles, un jeune mâle d'origine douteuse. Il est en présence d'un hybride nyroca x morillon, les oiseaux ne sont plus revus après le 10/11.

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*) : Progression constante de la présence de ce petit plongeur à Virelles comme aux BEH au cours de la période. Aux BEH, sont recensés 40 ex. le 05/09, 112 le 02/10, 260 le 15/11 et 433 le 28/11. A Virelles, sont recensés 92 ex. le 06/09, 157 le 25/09, 175 le 26/10 et 251 le 16/11.

Fuligule milouinan (*Aythya marila*) : 8 ex. de ce rare hivernant sont observés à Virelles dès le 25/10. Il s'agit de 8 jeunes formant le plus grand groupe jamais renseigné à Virelles. Le précédent record était de seulement 3 ex. et date du 22/01/89. Le 19/11, il n'y en a plus que 4 qui sont recensés. Aux BEH, où l'oiseau est plus habituel, une femelle est observée le 13/11.

Macreuse noire (*Melanitta nigra*) : 1 mâle adulte est observé aux BEH le 18/09. Il ne sera plus signalé par la suite.

Macreuse brune (*Melanitta fusca*) : A partir du 25/11, 3 individus sont observés aux BEH : 1 femelle et 2 H1 (premier hiver) dont un qui se nourrit d'une écrevisse.

Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*) : Le premier garrot observé à Virelles pour la saison se montre le 11/10. Le 04/11, il y en a 3 ainsi que le 25/11. Le 29, il n'y en a plus que 2. Aux BEH, 2 sont comptés le 05/11, 4 le 15/11 pour finalement en compter 9 à la fin du mois.

Harle bièvre (*Mergus merganser*) : Les premiers Harles bièvres de la saison sont découverts aux BEH le 13/11, le 28 ils sont au nombre de 7. A Virelles, c'est le 16 que le premier est observé et le 29, il y en a 6.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : Des Bondrées apivores sont encore de passage au-dessus de notre région durant les deux premières décades de septembre. Le 11, 4 individus cerclent au-dessus de Mariembourg et 20 au-dessus des BEH ! Un sujet tardif est observé le 12/10 à Mariembourg.

Milan noir (*Milvus migrans*) : Un Milan noir est observé à Virelles le 19/09 et un autre à Forges le 17/10.

Milan royal (*Milvus milvus*) : Des observations à Hemptinne (11/09), Jamagne (15/09), Villers-le-Gambon (16/09), Clermont-lez-Walcourt (18/09 et 30/10), Soumoy (17/10), Nismes (18/10), Mariembourg (20/10), Virelles (08/11) et Yves-Gomezée (16/11). A chaque fois, il s'agit d'un seul individu. Par contre le 24/09, ce sont deux milans qui sont observés à Couvin.

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : Le plus robuste de nos busards est observé un peu partout lors des deux premières décades de septembre. 7 ex. sont observés à Clermont-lez-Walcourt le 11 et 10 ex. à Jamagne le même jour. Plus surprenant, un jeune individu est observé à Virelles le 10/11 avec une proie dans les serres.

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) : Cet automne, la majorité des données proviennent des plaines de culture condruziennes, tandis que la plaine herbagère de la Fagne paraît plutôt délaissée. On peut supposer que c'est à mettre en relation avec des fluctuations dans l'abondance des micromammifères dont le Busard se nourrit. Les rassemblements n'excèdent pas 3 ex. (le 10/11 à Clermont-les-Walcourt). Le Busard Saint-Martin est mentionné à Jamagne, Jamiolle, Hemptinne, Roly, Aublain, Dailly, Froidchapelle, Couvin, Nismes, Yves-Gomezée et aux BEH.

Busard cendré (*Circus pygargus*) : 1 mâle présent le 04/09 à Clermont-lez-Walcourt sera notre dernière donnée annuelle. Rendez-vous au printemps prochain pour ce migrateur parti passer l'hiver sous des cieux plus cléments.

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) : Même si l'Autour reste peu renseigné, cet automne n'était pas le plus mauvais de ces dernières années : 7 observations en septembre, 2 en octobre et 4 en novembre, dont 6 observations d'oiseaux immatures. L'espèce est mentionnée à Sautour, Clermont-lez-Walcourt (3X), Nismes, Villers-le-Gambon, Saint-Aubin, Virelles (2X), Mariembourg, Hemptinne, Vierves et Roly.



Epervier d'Europe, Rièzes, le 12/11/08. Photo : Gaëtane Simonart.

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) : Un beau total de 83 contacts en fait un des rapaces les plus renseignés. Certes la Buse variable et le Faucon crécerelle sont certainement plus visibles mais ils ne sont pas systématiquement renseignés. Les observations sont réparties de façon homogène sur les trois mois de cette chronique. Dans certains cas, il s'agit d'oiseaux séjournant dans la région qui sont observés pendant plusieurs jours consécutifs.



Buse variable (*Buteo buteo*) : La Buse variable reste un de nos rapaces les plus cités car présent dans de nombreux villages en nombre appréciable. On notera les densités particulières suivantes : 11 ex. posés au sol dans le même champ dans la plaine de Clermont-lez-Walcourt le 30/10 ou encore 11 ex. sur 4 ha de prairies à Petite-Chapelle les 09/09 et toujours présentes le 08/10. Des mouvements migratoires sont constatés le 16/09 à Villers-le-Gambon et Vodecée.

*Jeune Buse variable.
Clermont, le 25/11/08.
Photo : Fanny Ellis.*

Buse des steppes (*Buteo buteo vulpinus*) : Cette année encore 2 mentions régionales de la très énigmatique Buse des steppes. Cette grande migratrice traverse très probablement notre région en très petits nombres. Nous vous invitons à relire nos chroniques dans "La Grièche 9" pour en connaître plus sur son statut exact. Quoi qu'il en soit, il est toujours souhaitable de transmettre une description de chacun des oiseaux pouvant se rapporter à ce taxon. Voici donc une brève description de ces 2 observations :

1/ Un individu de la forme sombre le 19/09 à Jamagne :

"Zone ancien moulin, un adulte de la forme sombre s'élève d'un bois, cercle puis glisse vers SO à 14h40-43. Il s'agit d'un oiseau de la forme sombre identique en tous points à l'individu de la photo 349 du "Forsman" : buse de taille nettement petite et de format compact (typique de "*vulpinus*"), couleur générale brun très sombre avec à peine une vague suggestion de U sur la poitrine, ailes très contrastées (intérieur blanc beaucoup plus "flashant" que chez une "*buteo*" et nettement contourné d'un large bord noir), queue brune avec barre terminale nette précédée d'autres barres plus diffuses."

2/ Un individu de la forme intermédiaire le 21/09 à Froidchapelle :

"Une buse présentant indéniablement les caractères d'une Buse de Russie (autre nom de la Buse des steppes) en halte (ce qui est rare). De forme intermédiaire, petite taille, queue rousse (orange) très nette avec de fines lignes transversales, pointe des rectrices blanches suivies d'un bord sombre tranchant nettement en bout de queue, bord de fuite de l'aile noir plus large que chez "*buteo*", contraste sous alaie très marqué, base des rémiges primaires blanches (vues du dessus) mais corps brun."

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*) : Le passage migratoire post-nuptial s'interrompt le 05/10. Certains oiseaux séjournent quelques jours sur l'étang de Virelles, avec le nombre incroyable de 9 ex. le 18/09. Un vrai festival pour les yeux! Ailleurs, le Balbusard est un migrateur rare. Il est mentionné aux BEH, à Donstiennes, Strée, Vierves-sur-Viroin et Villers-le-Gambon.



Balbuzard pêcheur, Virelles, le 11/09/08. Photo : Jean-Yves Scohy.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : L'espèce reste assez bien répartie, mais les abondances sont faibles cette année. Les observations proviennent de Matagne-la-Petite, Fagnolle, Villers-en-Fagne, Baileux, Rosée, Treignes, Villers-le-Gambon, Corenne, Moignelée, Mariembourg, Roly, Fraire, Frasnes-lez-Couvin, Villers-en-Fagne, Florennes, Morialmé, Chaumont. Au rayon insolite, 3 ex. passent la nuit sur le château d'eau du chemin de fer des 3 vallées à Mariembourg.

Faucon émerillon (*Falco columbarius*) : Il est observé dès le premier septembre et jusqu'au 25/10 à Chaumont, Hemptinne, Clermont-lez-Walcourt, Jamagne, Flavion, Merlemont. Le plus souvent, les oiseaux sont mentionnés en migration active mais 2 observations concernent des migrateurs en halte.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) : Les nombreux contacts proviennent tous de septembre. 3 observations concernent un groupe de 2 oiseaux, les autres des oiseaux isolés. L'espèce est vue à Jamagne, Mariembourg, Clermont-lez-Walcourt, Froidchapelle, Virelles, Morialmé, Saint-Aubin, Forges, Hemptinne, Florennes.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : A l'exception d'une observation à Nismes et d'une à Virelles, ce rapace prestigieux est surtout mentionné autour des BEH et dans les plaines condruziennes. L'espèce paraît plus abondante en septembre que pendant les 2 mois suivants.

Perdrix grise (*Perdrix perdrix*) : Un maximum de 6 ex. à Clermont-lez-Walcourt, 15 ex. à Hemptinne et jusqu'à 8 à Saint-Aubin. Rien de plus à « accrocher au tableau de chasse » des ornithologues pour cet automne.

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*) : Cet exotique est mentionné uniquement à Chaumont et Rosée mais est certainement plus abondant.

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : Pendant le mois de septembre, plusieurs Râles d'eau sont observés régulièrement à Virelles (au plus 4 ex. le 02). Octobre et novembre semblent coïncider avec une diminution des effectifs. Ailleurs, 4 ex. sont entendus à Roly le 15/11 et 1 ex. séjourne dans une saussaie/mégaphorbiaie inondée à Mariembourg au début novembre.



Gallinule poule d'eau juvénile, Virelles, le 11/09/08. Photo : Jean-Yves Scohy.

Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*) : A nouveau peu mentionnée cet automne, la poule d'eau est observée régulièrement à Virelles : max 10 ex. le 06/09. L'espèce y est observée jusqu'au 4/10 (3 ex.) mais n'est plus renseignée par la suite. Un juvénile est observé le 08/09 à Treignes et un autre le 15/09 à Mazée. 2 ex. se nourrissent sur un bord de route à proximité d'un étang à Fagnolle le 23/10. Enfin 7 ex. sont présents au BEH le 15/11.

Foulque macroule (*Fulica atra*) : Les BEH accueillent à nouveau de belles troupes de foulques : 360 ex. le 11/09, 350 ex. le 18/09, 699 ex. le 15/11. A Virelles : 84 ex. le 06/09, 32 ex. le 04/10, 46 ex. le 16/11. A Roly, l'espèce est très peu abondante cet automne : 1 ex. le 24/11 et 4 ex. le 28/11.

Grue cendrée (*Grus grus*) : Plusieurs groupes sont observés lors du mois de novembre pour le plus grand plaisir des ornithologues régionaux : 45 ex. le 01/11 aux BEH, 15 ex. à Merlemont et un groupe nocturne à Froidchapelle le même jour, un vol nocturne à Petigny le 16/11, 28 ex. à Baileux le 17/11 et 60 ex. à Rosée le même jour, 1 vol nocturne à Mariembourg le 24/11.

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*) : 1 juvénile posé le 11/09 à Virelles.

Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*) : Quelques observations de Grands Gravelots isolés aux BEH : 1 juvénile le 08/09, 1 adulte les 18 et 19/09.

Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*) : 4 exemplaires le 04/09 terminent le balai de ces limicoles sur le site de Clermont-lez-Walcourt. Pendant les mois d'août et septembre, 84 ex. y ont été observés, ce qui fait de cette année 2009 la seconde meilleure pour les 15 dernières années.

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*) : L'espèce n'est renseignée que dans la plaine de Clermont-Ragnies-Donstiennes-Thuillies : 1 ex. le 04/09, 1 le 11/09, 10 ex. le 28 /09 et 1 ex. le 30/10.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) : De nombreuses bandes sont renseignées durant toute la période. Les plus grandes sont renseignées à Clermont-lez-Walcourt (1000 ex. le 11/09) ou encore à Virelles (800 ex. entre 18 et le 22/09).

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*) : Du 16 au 19/09, un petit afflux de ce limicole beaucoup plus rare dans les terres que sur la côte atteint les BEH : 1 ex. le 16, 3 ex. le 18 et 2 ex. le 19. Tous sont des juvéniles.



Bécasseau sanderling, BEH (Plate Taille), le 18/09/08. Photo : Bernard Hanus.

Bécasseau minute : Du 15/09 au 28/09, Virelles accueille de 1 à 2 ex., souvent en plumage juvénile. L'espèce est observée une seule fois au BEH, le 17/09, à proximité du centre d'accueil de la Plate Taille.

Bécasseau variable : 4 observations nous sont communiquées, toutes en septembre : 1 ex. à Virelles le 04, 1 ex. aux BEH le 08, 1 ex. à Donstiennes le 14 et 1 dernier à Virelles le 27.

Combattant varié (*Philomachus pugnax*) : De 1 à 4 ex. sont observés à Virelles entre le 15 et le 22/09. Egalement 1 ex. dans un groupe de Vanneau le 24/09 à Rosée et 2 ex. dans un groupe mixte avec des pluviers et quelques Vanneaux huppés à Clermont-lez-Walcourt le 28/09.

Bécassine sourde (*Lymnocryptes minimus*) : 2 données pour la période, une décolle d'un champ détrempé le 22/11 à Castillon, une autre est observée le 30/11 dans la plaine de l'Eau Blanche. Rappelons qu'une recherche spécifique de cette espèce dans les fonds de vallées humides permettrait certainement de mieux cerner le statut de cette espèce hivernante.

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : Près de 50 données rentrées sur le trimestre pour cette bécassine qui ne niche malheureusement plus en Wallonie. La majorité provient de Virelles mais aussi de Jamagne, Yves-Gomezée, BEH, Mariembourg, Clermont-lez-Walcourt, Forges, Roly et Romedenne. On note un maximum d'une centaine d'ex. le 10/11 à Virelles.

Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) : Diverses mentions de notre Scolopacidé forestier, on notera des maxima, lors de recherches spécifiques, de 14 ex. le 27/11 à Bailièvre et de 11 ex. le 24/11 à Forges.

Courlis cendré (*Numenius arquata*) : Deux mentions : 1 ex. en vol à Hemptinne le 08/09 et 1 ex. au sol le 11/09 à Ragnies.

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*) : Une seule donnée d'un juvénile, le 08/09 aux BEH.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : Deux à trois individus du 04 au 11/09 à Virelles.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*) : Mis à part un individu signalé le 25/09 à Saint-Aubin, la queue de migration est encore renseignée à Virelles où maximum 2 ex. seront observés le 18/09. On note encore un exemplaire tardif le 15/11 à Romedenne.

Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*) : Le plus cité de nos chevaliers est contacté à Virelles, Jamagne, Vierves-sur-Viroin et aux BEH. A Virelles, un maximum de 14 ex. seront présents le 06/09. Aux BEH, un exemplaire semble vouloir jouer les prolongations comme les années précédentes.

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) : Un jeune individu le 04/09 dans la plaine de Clermont-lez-Walcourt. Un ex. (le même ?) le 11/09 aux BEH.

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : Aucun comptage exhaustif n'a eu lieu au dortoir des BEH durant la période, cependant, certaines concentrations locales donnent une idée de l'abondance de l'espèce. Ainsi, 1.500 ex. sont comptés dans les champs d'Hemptinne le 18/09, 600 ex. à Yves-Gomezée le 19/10, 350 à Chastrès le 23/10,...

Goéland cendré (*Larus canus*) : Le Goéland cendré est un hôte hivernal dans notre région. Pas de mention en septembre, une seule en octobre d'un ex. le 19 à Yves-Gomezée, en novembre la population s'étoffe avec un maximum renseigné de 29 ex., le 19/11, aux BEH.

Goéland brun (*Larus fuscus*) : Le Goéland brun a bien été suivi au dortoir des BEH sur la période. Conséquence de la fermeture de la décharge d'Erpion aux déchets ménagers, les effectifs sont sensiblement en-deçà des années précédentes. On notera néanmoins les maxima mensuels suivants : 2500 ex. le 25/09, 2200 ex. le 11/10 et 1100 ex. le 11/11.

Goéland argenté (*Larus argentatus*) : Tout comme le Goéland cendré, l'argenté possède un spectre d'apparition hivernal dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Les premiers exemplaires sont signalés en novembre. Un net arrivage dû au froid est signalé le 28/11 aux BEH.

Goéland leucopnée (*Larus michahellis*) : Présent durant toute la période, mais aucun comptage exhaustif effectué. L'espèce est régulièrement observée en compagnie des Goélands bruns dans différents endroits de la zone qui nous concerne.

Goéland pontique (*Larus cachinnans*) : Espèce également d'apparition hivernale, elle est renseignée le 04/09 à Clermont-lez-Walcourt, ensuite à partir du 01/11 les données vont devenir de plus en plus régulières avec un maximum de 6 ex. le 14/11 aux BEH, mais, à cette époque, l'effectif global est déjà légèrement au-delà et doit avoisiner les 10 ex.

Guifette noire (*Chlidonias niger*) : Seul, l'étang de Virelles profitera du passage des guifettes avec de 1 à 3 ex. du 02 au 11/09.

Pigeon colombin (*Columba oenas*) : Observé en petits nombres, sur la période, à Nismes, Viroinval, Mariembourg, Vaulx, avec un maximum de 31 ex. le 21/09 à Jamagne.

Pigeon ramier (*Columba palumbus*) : Observé partout dans la région, on retiendra le passage remarqué à partir de fin octobre d'effectifs journaliers dépassant parfois plusieurs milliers d'individus comme à Mariembourg à partir du 20/10.

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : Renseignée ici et là avec des maxima de 19 ex. le 19/10 à Vodecée, de 17 ex. le 04/10 à Yves-Gomezée et de 14 ex. le 30/10 à Hemptinne.

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : Les dernières de la saison seront aperçues aux BEH avec 1 ex. le 03/09 et 1 ex. le 10/09.

Effraie des clochers (*Tyto alba*) : Renseignée à Matagne-la-Petite, Viroinval, Doische, Mariembourg, Yves-Gomezée, Frasnes-lez-Couvin, Baileux, Chimay, Hanzinne, Laneffe mais reste néanmoins sous-détectée.

Chouette chevêche (*Athene noctua*) : Seulement notée à Treignes, Froidchapelle, Aublain, Gerpinnes et Roly. Notre petite chouette mériterait un peu plus d'attention de la part des observateurs.

Chouette hulotte (*Strix aluco*) : Comme l'espèce précédente, la hulotte a été peu renseignée et seulement à Viroinval, Treignes, Mariembourg, Froidchapelle et Roly.

Hibou grand-duc (*Bubo bubo*) : Renseignée dans divers villages, cette espèce est bien implantée dans les carrières de la région.

Hibou moyen-duc (*Asio otus*) : Des individus isolés renseignés à Viroinval, Saint-Aubin et Nismes. Un dortoir de 9 ex. est découvert le 27/11 à Bailièvre.

Hibou des marais (*Asio flammeus*) : Un individu a été trouvé 07/09 entre Philippeville et Villers-le-Gambon. Il était empêtré dans un fil barbelé et était pendu par son aile droite. Il a été emporté au centre de revalidation de Manuy-Saint-Jean. Le pronostic était incertain.

Martinet noir (*Apus apus*) : Les derniers de l'année sont : 1 ex. le 09/09 à Mariembourg et 1 ex. le 11/09 à Daussois.

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) : De nombreuses citations en provenance de Virelles, BEH, Mariembourg, Fagnolle, Sart-en-Fagne, Petite-Chapelle, Treignes et Roly. Une bonne santé de l'espèce donc après une suite d'hivers doux.



Martin-pêcheur d'Europe, Virelles, le 11/09/08. Photo : Jean-Yves Scohy.

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : 2 mentions : 1 ex. le 01/09 à Chaumont et 1 ex. le 11/09 à Clermont. Avec celui du 25/08 à Saint-Aubin, cela nous fait 3 individus pour l'automne, ce qui est un bon score.

Pic vert (*Picus viridis*) : Renseigné seulement à Rosée, Brûly-de-Couvin, Forges et Virelles mais évidemment beaucoup plus répandu.

Pic noir (*Dryocopus martius*) : 20 données, correspondant souvent à des individus différents, nous donnent une image plus réaliste de la situation de cette belle espèce rencontrée à Olloy-sur-Viroin, Nismes, Treignes, Saint-Aubin, Virelles, Brûly-de-Couvin, BEH, Doische, Fagnolle, Forges, Mazée, Dourbes et Nismes.

Pic épeiche (*Dendrocopos major*) : Commun et donc peu renseigné comme à Clermont-lez-Walcourt, Virelles, Romedenne, Morialmé et Oignies-en-Thiérache.

Pic mar (*Dendrocopos medius*) : Ce pic est naturellement très discret, même au printemps il se fait peu entendre et remarquer, sans recherche spécifique il est habituel de peu l'observer. Moins de quinze observations, qui à l'exception d'une seule à Viroinval, proviennent toutes de la Fagne schisteuse où domine son peuplement forestier préféré, la chênaie. Il est vu à Virelles où il se rend à la mangeoire, à Roly, aux BEH et à Mariembourg.



Pic épeichette (*Dendrocopos minor*) : Dès la fin de l'été, il vagabonde en criant assez régulièrement, ce qui permet de le surprendre en forêt et dans les vergers, mais aussi dans le bocage, au cœur des villages, près des gares et autres endroits peu arborés où il est normalement absent. Vu à Mariembourg, Treignes, Olloy-sur-Viroin, Virelles, Couvin et à Roly.

Pic épeichette, Nalinnes le 10/09/08.
Photo : Fanny Ellis.

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : Vue surtout en vol migratoire à partir du 26/09 même si cette première donnée à Florennes concerne 10 ex. se dirigeant vers le nord-ouest, ensuite observée à Couvin, Saint-Aubin, Merlemont et Hemptinne (dernière donnée, 07/11). Mais elle se pose aussi au sol en zones dégagées comme des chaumes ou des éteules de maïs à Roly, Mariembourg et à nouveau à Saint-Aubin.

Alouette des champs (*Alauda arvensis*) : 5 données en septembre à Hemptinne, Clermont-lez-Walcourt et Florennes, traduisent une migration encore bien ténue, mais celle-ci va croître à partir du 26/09, 211 ex. à Florennes, pour donner quelques chiffres lors de comptages en octobre comme à Saint-Aubin pour 381 ex. en 2 heures le 20/10, 230 ex. en moins d'une heure à Mariembourg le 26/10 pour 375 ex. le 01/11. Aussi vue à Clermont-lez-Walcourt, Matagne-la-Grande, Senzeille, Hemptinne, Jamagne, Forges, aux BEH. Dès le 18/11, diverses petites bandes de 20 à 60 ex. maximum stationnent à Saint-Aubin, Villers-le-Gambon, Hemptinne et Yves-Gomezée, soit la région où dominent le plus les cultures, pour nous annoncer le début de l'hivernage.

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : Les dernières qui traînent un peu sont vues à Hemptinne, Virelles (10 à 20 ex.), les BEH (20 ex.) jusqu'à la dernière vue le 15/09 à Saint-Aubin.

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : Des bandes sont rassemblées sur les fils dans chaque village et la migration est observée dès le premier jour de septembre avec 83 ex. dénombrés en cinq minutes à Hemptinne, certaines s'arrêtent alors à Virelles pour atteindre au moins 900 ex. le 04 et aux BEH avec 175 ex. le 05, le passage actif continue et est mentionné à Clermont-lez-Walcourt, à Daussois, à Saint-Aubin (300 ex. en 45'), cela se calme à partir du 19 où les chiffres ne dépassent plus la cinquantaine d'oiseaux pour s'achever avec des isolés dans quelques villages comme Jamiolle, Corenne et Mariembourg. Deux dernières données d'oiseaux en vol migratoire, en octobre, 1 ex. à Hemptinne le 04 et à Mariembourg le 20.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) : Si comme pour l'espèce précédente des bandes ne dépassant pas la centaine d'individus sont encore rassemblées sur les fils dans chaque village, des groupes plus importants stationnent au-dessus des plans d'eau la première semaine de septembre avec 250 à 900 ex. à Virelles, 350 à 600 ex. aux BEH. Ensuite, chute rapide des effectifs, au maximum 25-30 ex. par endroit, pour atteindre les dernières données début octobre avec deux observations plus particulières, 60 ex. à Gonrioux rasant les maisons le 06/10 et 1 ex. albinos à Vierves-sur-Viroin le 07/10.

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : Nicheur plutôt habituel du sud et de l'est de l'Europe où il affectionne les sols nus et arides, il passe en migration dans nos contrées assez haut en vol les premières heures de la matinée pour se poser ensuite dans des champs terreux où il devient presque invisible. C'est son cri qui permet le plus souvent à l'observateur familier de cette espèce assez rare de la repérer. Si la migration commence à la mi-août pour s'achever en octobre, c'est en septembre qu'a lieu le pic du passage. Cette année, il est pas mal renseigné du 04 au 14/09, soit sur une dizaine de jours : Clermont-lez-Walcourt 1 ex. le 04 et 9 ex. le 11, Jamagne 3 ex. également le 11, Thuillies 2 ex. le 14.

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) : Hormis 1 ex. le 19/10 à Dourbes, toutes les autres données proviennent de septembre, le plus souvent d'oiseaux en vol migratoire, en très petits nombres, au maximum la dizaine d'individus ensemble ou comptabilisée lors d'un suivi, passage très diffus tout au long du mois.

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) : Bien que plus noté que l'espèce précédente, il faut attendre le 19/09 pour qu'un passage assez faible soit remarqué et que quelques bandes (20-30 ex. au maximum) stationnent ici et là, en octobre la migration se traduit par exemple avec 104 ex. en 2h20 à Hemptinne le 04, les groupes au sol peuvent alors atteindre 60 et 70 oiseaux comme à Jamagne. Il est alors observé à Mariembourg, Fagnolle, Rance, Senzeille, Clermont-lez-Walcourt, Virelles. En novembre, 15 ex. stationnent en prairie à Fagnolle, candidats pour un hivernage ?

Pipit à gorge rousse (*Anthus ervinus*) : Espèce de l'extrême nord, très rarement observée lors de son passage en migration car l'Europe occidentale est en marge de son couloir. Il est le plus souvent en compagnie du farlouse dont il s'en distingue au cri pour l'essentiel, comme lui, il affectionne plutôt les biotopes humides. 1 ex. (voire 2 ex.), trouvé par Hugues Dufourny, le 04/10 à Hemptinne.

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) : Un premier exemplaire le 04/10 de cette espèce montagnarde est contacté à Virelles. Il hiverne dans nos contrées, recherchant surtout les prés humides de la Fagne et les vasières dégagées en bordure d'étang. En petits groupes (moins de 5 ex.), il est ensuite noté à Saint-Aubin, Fagnolle, Roly et Virelles. Les maxima sont atteints avec 10 ex. à Merlemont le 01/11, Fagnolle le 12/11 et 15 ex. dans la première neige à Virelles le 22/11.

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava flava*) : Très bien notée la première quinzaine de septembre au maximum de son passage avec plusieurs dizaines d'individus par endroit, elle chute alors rapidement pour concerner des ex. isolés dont un à Mariembourg le 26/09 et un ex. très attardé à Dourbes le 19/10.

Bergeronnette printanière nordique (*Motacilla flava thunbergi*) : Deux données, 1 ex. en compagnie de trois printanières type le 01/09 puis un autre ex. avec deux printanières type le 8/09 toujours à Hemptinne.

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) : Très bien notée cet automne avec 38 mentions pour notre lavandière à proximité de nos rivières, ruisseaux et étangs. Bien qu'elle fréquente l'eau toute l'année, on peut la surprendre en migration active comme les 11, 16 et 17/09 où 1 ex. est à chaque fois noté en vol au-dessus des plateaux agricoles de Clermont-lez-Walcourt, Chaumont, Hemptinne et Saint-Aubin.

Bergeronnette grise (*Motacilla alba alba*) : Si quelques familles volantes sont encore notées dans les villages ou en prairie, la migration se traduit par des bandes au nombre plus important comme 23 ex. à Virelles le 03/09, 40 ex. le 15/09 aux BEH. En octobre, le comptage à un dortoir de Mariembourg donne 207 ex. le 08, 156 le 09, 84 le 10, 47 le 14 pour diminuer jusqu'à 25 ex. le 20/10, puis atteindre le minimum de 11 ex. le 28/10. Après 1 ex. vu à Philippeville le 31/10, novembre abrite encore 3-4 ex. aux BEH, puis un seul le 25 ainsi qu'à Mariembourg le 26.

Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) : Trois données, dont 1 ex. qui esquisse des bribes de chant le 13/11 à Couvin. Pour rappel, le chant hivernal est dans la norme chez le merle d'eau.

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : Quatre données d'exemplaires isolés, le calme avant la reprise du chant chez cette espèce assez hâtive, dont 1 ex. chanteur le 09/11 à Petigny (Les Roches).

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) : Une donnée du traîne-buisson très discret en cette période.

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) : Le dernier du trio d'oiseaux communs est nettement plus renseigné que les deux précédents car il chante encore, comme à Virelles où 3 ex. égaient les abords de la roselière le 26/09, et est plus remarqué avec l'arrivée des migrateurs nocturnes comme ces 43 ex. comptabilisés entre Mariembourg et Fagnolle sur 2 km du Ravel et les haies qui le bordent le 13/10. Sinon, régulier dans les jardins, en forêt, vergers, etc.



*Rougegorge familier, Virelles, le 11/10/08.
Photo : Philippe Deflorenne.*

Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : Pas de données en septembre cette année.

Gorgebleue à miroir blanc (*Luscinia svecica*) : S'agit-il des nicheurs locaux attardés ou de derniers oiseaux de passage, 1 ex. observé à chaque fois mais les nuances de couleurs sur le plumage laissent supposer au moins deux individus distincts, observés les 06, 07 et 08/09 à l'étang de Virelles.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : 28 observations de cette espèce qui peut s'attarder, voire hiverner en très petits nombres. Quelques derniers chanteurs comme le 10/09 à Nismes et le 09/11 à Petigny, puis surtout des individus migrateurs en prairies et bocages, en ex. isolé ou par 2-3 ex. tout septembre et octobre à Froidchapelle, Rosée, Saint-Aubin, Yves-Gomezée, Hemptinne, Gonrieux, Philippeville, Dourbes, Florennes, Forges, ... En novembre, 1 ex. le 06 à Virelles et Vierves-sur-Viroin, 1 ex. à Mariembourg les 17 et 29.

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) : 33 données, c'est beaucoup plus que les autres années pour cette espèce qui s'attarde peu et dont les jeunes ainsi que les femelles ne sont pas évidents à distinguer, à distance, du rougequeue noir. En dehors d'un ex. du 07 au 14/09 au même endroit à Froidchapelle, l'ensemble de la région est concerné entre le 16/09 et le 27/09 à Chaumont, Vodecée, Mariembourg, Clermont-lez-Walcourt, Jamiolle, Hemptinne, Jamagne, BEH, Flavion, Fagnolle, Saint-Aubin, Florennes et Virelles. Une seule donnée provient d'octobre, une femelle très tardive à Vodecée le 22/10.

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 39 données, un record, toutes en septembre. S'il ne niche plus dans notre région, il est, par contre, un migrateur fidèle. En prairie, il faut le rechercher posé sur les fils barbelés ou sur le haut des piquets car il chasse les insectes du sol à vue, posté donc « en hauteur » afin de dominer du regard un minimum de surface. En cas d'absence de ces perchoirs, il adoptera des petits buissons, une solide graminée ou ombellifère, divers objets. En culture, il adoptera volontiers les plants de betteraves en graines ou le maïs. S'il est parfois isolé, il préfère se déplacer en petits groupes pouvant totaliser plus de dix, voir 20 ex. un peu dispersés, il est vrai, en fonction de la densité des perchoirs disponibles. C'est la première quinzaine de septembre qui recueille cet automne la majorité des observations. Le dernier est vu le 30/09 à Virelles.

Tarier pâtre (*Saxicola torquata*) : Migrateurs ou oiseaux encore cantonnés, de nombreuses observations de cette espèce sont réalisées durant le mois de septembre avec, par exemple, 6 individus entre Dailly et Pesche, 6 à Morialmé (dont une famille), 3 à Nismes, Fagnolle et Jamagne. D'autres sont observés à Rosée, Hemptinne, Virelles, aux BEH, ... Le mois d'octobre est plus calme avec encore 3 individus à Jamagne et des isolés, surtout entre les BEH et Mariembourg. Aucune donnée pour le mois de novembre.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : Bonne année pour cette espèce lors du passage automnal avec une dernière observation tardive, le 23 octobre. Pour septembre, 26 données rentrées avec de belles concentrations entre Donstiennes, Clermont et Thuillies (40 le 05, 15 le 11 et 10 le 14) mais aussi 6 le 01 et 8 le 08 autour d'Hemptinne. Des observations de duos ou d'isolés sont réalisées à Mariembourg, Vodelée,

Flavion, Froidchapelle, Saint-Aubin, ... En octobre, les derniers migrateurs sont notés à Jamagne, aux BEH, à Forges et à Chastrès.

Merle à plastron (*Turdus torquatus*) : Moins observé à l'automne qu'au printemps, une seule donnée : une femelle aux BEH, le 2 novembre.

Merle noir (*Turdus merula*) : Une dizaine de données pour ce Turdidé sédentaire mais aussi migrateur : des arrivages d'oiseaux migrateurs sont notés le 16 septembre à Saint-Aubin et le 26 octobre à Morialmé.

Grive litorne (*Turdus pilaris*) : Si quelques oiseaux sont observés en septembre à Hemptinne, le premier groupe important de migrateurs est vu à Mariembourg le 19 octobre et 50 le 30 octobre à Clermont-lez-Walcourt, puis il faut attendre le mois de novembre pour noter des bandes de la litorne, nicheur rare dans l'ESEM : 200 le 2 à Mariembourg, 150 le 7 à Hemptinne, 90 le 30 à Gonrieux, et le 7 à Saint-Aubin. De plus petits groupes sont observés à Florennes, Romedenne, Jamagne et à nouveau Saint-Aubin et Hemptinne.

Grive musicienne (*Turdus philomelos*) : Les premiers mouvements migratoires sont notés à la mi-septembre puis des grands groupes dont 35 ex. le 25 et 15 le 22 à Hemptinne, 45 à Florennes et 30 à Jamagne le 26. Si des bandes de plusieurs dizaines ou centaines d'oiseaux sont encore observées à Mariembourg début octobre, les données pour octobre et novembre de ce Turdidé concernent soit de petits groupes comme 7 ex. à Treignes le 26/10, 5 ex. à Doische le 27/10 et 4 ex. à Jamagne le 16/11, soit des oiseaux isolés, à Florennes, Hemptinne, Virelles, Nismes, Yves-Gomezée et aux BEH.

Grive mauvis (*Turdus iliacus*) : Après le passage des premiers éclaireurs à partir de la fin septembre, 5 individus de cette grive du Nord sont notés à Philippeville le 16 octobre, la première bande est signalée à Senzeille (25 ex. le 18/10). Jusqu'à la dernière décade de la période, l'afflux migratoire sera enregistré dans toute les régions, avec une masse de 500 oiseaux le 20/10 à Saint-Aubin, 80 le 24/10 encore à Saint-Aubin et le 06/11 à Vierves, 75 le 22/10 à Vodecée, 70 à Corenne le 20/10, 60 à Forges le 20/11 et quelques dizaines à Treignes, Clermont-lez-Walcourt, Gonrieux et Jamagne

Grive draine (*Turdus viscivorus*) : 12 ex. le 30/09 à Petite-Chapelle et 9 à Treignes le 24/10 sont les deux seuls rassemblements notés pour cette grive discrète. Des oiseaux sont vus à Dourbes, Matagne-la-Petite, Nismes, Florennes (2), Olloy-sur-Viroin (2), Romedenne (3), ... et ce à partir du 20 octobre.

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) : Une seule donnée pour cette période : un ex. est observé à Hemptinne dans une ancienne carrière le 16/09.

Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*) : En dehors des données annuelles à Virelles où cette année encore 4 oiseaux, le 08/09 et 10 le 13/09, sont comptabilisés sur le site de l'étang, un ex. est observé le 19/09 à Jamagne et un le 27/09 à Hemptinne, tous les deux dans une haie.

Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*) : Cinq données, entre le 15/09 et le 04/10, pour cette fauvette discrète lors de la migration d'automne, et toutes dans le nord de la région : 2 à Jamagne et Hemptinne et 1 à Saint-Aubin.

Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : Hormis 3 oiseaux observés à Hemptinne le 01/09, la grisette a été observée seule à 6 reprises jusqu'au 19 septembre, 2 fois à Hemptinne et à Saint-Aubin et une fois à Fagnolle et à Jamagne.

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) : Comme pour les fauvettes précédentes, les observations d'oiseaux en migration se concentrent essentiellement dans le Condroz avec 3 oiseaux observés à Saint-Aubin le 11/09 et 1 les 01 et 15/09 à Hemptinne. Un ex. est également signalé à Gonrieux le 14/09.

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : Durant la seconde quinzaine de septembre, la migration bat son plein et des groupes de 30 ex. sont notés à Saint-Aubin le 11/09 et à Hemptinne le 15/09. Dans cette dernière localité, 21 individus ont été observés le 19/09, 15 le 22, 10 le 25 et 11 le 27 pour retomber à 2 le 04/10. Quelques oiseaux seront encore vus entre Couvin et les Matagnes début octobre dont 3 le 4 à Matagne-la-Petite.

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) : Si de nombreux mâles chantent encore en septembre (4 à Nismes le 09 et 5 à Treignes le 24), c'est à la fin du mois que sont signalées les premières manifestations de migration avec 20 ex. le 25 à Hemptinne et 4 à Virelles. A Mariembourg, ce passereau terne fait partie d'un genre (*Phylloscopus*) bien suivi en automne dans cette localité et le véloce y a été observé à de nombreuses reprises en octobre. Notons, par exemple, sur des trajets d'environ 2 km, 12 ex. le 03, 25 le 08, 11 le 16 et 12 le 18. Ensuite, de 1 à 4 ex. sont signalés jusqu'à la fin de la période. Ailleurs, des oiseaux traînent à Hemptinne, Saint-Aubin, Vierves-sur-Viroin, Cerfontaine, Virelles et Couvin où 3 ex. sont vus le 17/11. Un dernier chanteur a été entendu à Philippeville le 19/10.



Pouillot véloce, Nalinnes, le 09/10/08. Photo : Fanny Ellis.

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochillus*) : Le fitis a été noté à 7 reprises durant la première quinzaine de septembre, à Chaumont, Hemptinne, Vodecée, aux BEH, à Treignes et deux fois à Saint-Aubin.

Roitelet huppé (*Regulus regulus*) : Une migration rampante de quelques oiseaux est observée à Hemptinne le 27/09.

Roitelet triple-bandeau (*Regulus ignicapillus*) : 2 derniers ex. sont signalés à Couvin le 03/10.

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : Signalé avant le grand départ à Chaumont, Saint-Aubin et à Mariembourg deux fois, entre le 01 et le 18/09.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : Une observation, dans une ancienne carrière, d'un mâle le 08/09 à Hemptinne.

Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*) : Entre 3 et 5 "mésanges à moustaches" sont vues et entendues dans les roselières nord puis ouest de l'étang de Virelles à partir du 16/11.

Mésange à longue-queue (*Aegithalos caudatus*) : 2 bandes signalées dans les localités de Morialmé (21 ex. le 15/09) et de Virelles (20 ex. le 09/11) sont les seules données reçues pour cette espèce.

Mésange nonnette (*Parus palustris*) : 5 données, seulement en novembre, pour cette espèce commune, surtout en milieux forestiers.

Mésange boréale (*Parus montanus*) : Deux oiseaux aux BEH le 18/10 et deux à Romedenne à la mi-novembre, cette espèce est peu renseignée et c'est sans doute dommage car elle est considérée comme en régression dans certaines régions et donc à surveiller.

Mésange huppée (*Parus cristatus*) : Bien présente partout où il y a des conifères, un des rares passereaux à huppe est signalé à Nismes, Hemptinne, Morialmé, Froidchapelle et Momignies.



Mésange noire (*Parus ater*) : 14 ex. à Saint-Aubin le 11/09 et 7 ex. à Hemptinne le 15/09 sont les plus grands groupes signalés durant la période pendant laquelle des mouvements sont suspectés. L'espèce est aussi contactée à Mariembourg, Momignies, BEH, Nismes, Froidchapelle, Virelles et Romedenne.

Mésange bleue (*Parus caeruleus*) : Si ce n'est 5 individus signalés à Roly, les autres données proviennent de Morialmé, avec un maximum de 8 oiseaux observés le 31/10.

Mésange charbonnière (*Parus major*) : 28 mentions pour la mésange cravatée de noir. Cette espèce commune exploite déjà les mangeoires en septembre, comme ces 2 ex. le 07 à Morialmé.

*Mésange charbonnière, Nalinnes, le 15/10/08.
Photo : Fanny Ellis.*

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) : Ce beau sédentaire forestier est fréquent dans les secteurs arborés. Notre acrobate est mentionné à douze reprises sans remarque particulière.

Grimpereau des jardins (*Certhya brachy-dactyla*) : On n'enregistre qu'une seule donnée pour ce grimpeur commun en forêt.

*Sittelle torchepot, Bioul, le 20/10/08.
Photo : Olivier Colinet.*



Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : Ce passereau au bec recourbé disparaît de nos régions bien avant la fin de l'été. Une seule donnée avec 1 ex. le 15/09 à Philippeville.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : Ce prédateur est admiré sur 5 sites différents et tous situés en Fagne schisteuse. Un individu est présent à Roly durant toute la période. Ailleurs, 1 ex. le 21/09 à Fagnolle, un

autre à Romerée le 22/10 et 1 ex. le 23/10 à Doische, un dernier contact pour cette période avec 1 ex. le 13/11 à Cerfontaine.

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) : Ce Corvidé vagabonde ici et là à la recherche de glands. Aucun erratisme de grande ampleur n'est remarqué. Tout au plus 16 ex. le 19/09 à Hemptinne et 23 ex. le 26 à Florennes.

Pie bavarde (*Pica pica*) : Aucun chiffre significatif n'est signalé pour notre pie voleuse.

Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) : Qu'en est-il de la petite population ardennaise au sud du Viroin ? Nous ne disposons que de peu d'informations récentes. L'attrait des noisettes pousse le Corvidé forestier à être moins farouche. Il sera noté en novembre à deux reprises : 1 groupe de 7 ex. le 03 et 1 ex. le 12 à Oignies-en-Thiérache.

Choucas des tours (*Corvus monedula*) : Les troupes automnales de ce petit Corvidé grégaire sont signalées un peu partout excepté en Ardenne. Parmi les plus beaux groupes, on peut signaler 100 ex. le 27/09 à Saint-Aubin, 200 ex. le 09/10 à Matagne-la-Grande et à nouveau à Saint-Aubin 138 ex. le 20/10. En novembre, on retient 120 ex. à Couvin. L'espèce est considérée en augmentation en Fagne mariembourgeoise.

Grand corbeau (*Corvus corax*) : Depuis l'automne et l'hiver 2007-2008, le puissant charognard n'est plus un visiteur exceptionnel en Fagne de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Des observations récentes s'ajoutent aux précédentes. L'espèce semble régulière à Roly puisqu'elle y est enregistrée à huit reprises. En octobre, 3 ex. le 13, 2 ex. le 15, le 18 et probablement les mêmes oiseaux le dernier jour du mois. Le Grand Corbeau hante toujours ce beau coin de notre région en novembre puisque le croassement ténébreux de l'espèce y est reconnu le 04 et encore deux exemplaires au même endroit le 07. Dans son fief ardennais de prédilection, un beau groupe de 11 ex. survole Oignies-en-Thiérache le 12/11.

Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) : Tard en octobre ou début novembre, les bandes de freux déferlent au dessus de notre région. Ce Corvidé migrateur n'est pourtant renseigné qu'à cinq reprises. 5 ex. exploitent un fumier le 16/09 à Rosée, 1 isolé le 19/10 sur Viroinval. La migration est bien remarquée le 01 et le 02/11 à Mariembourg. 12 ex. stationnent le 07/11 à Romerée.



Etourneau sansonnet, Bioul, le 10/10/09. Photo : Olivier Colinet.

Corneille noire (*Corvus corone*) : Ce Corvidé commun n'est guère courtoisé par nos observateurs. On signale toutefois 120 ex. le 15/11 au pré-dortoir de Couvin.

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : Tout au plus 11 données sans véritable relief pour un oiseau connu pour ses impressionnants dortoirs.

Moineau domestique (*Passer domesticus*) : Maigre bilan (13 données) pour une espèce familière dont le statut régional n'est pas bien connu.

Moineau friquet (*Passer montanus*) : De petites troupes se rassemblent dans les chaumes et les friches durant les mois d'automne et d'hiver. Quelques volées sont renseignées et les plus importantes concernent le nord de notre zone. 60 ex. le 01/09 à Daussois, 24 ex. le 22 du même mois à Hemptinne. On note aussi quelques individus le 03/09 à Rosée et à Nismes le 10. En octobre, des troupes éparées et réduites sont épinglées à Mariembourg et Fagnolle. Seulement 2 données en novembre avec 10 ex. tout le mois à Mariembourg et le même chiffre le 04/11 à Matagne-la-Petite.



Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : Comme en automne 2008, aucun chiffre particulier pour ce migrateur abondant.

*Pinson des arbres,
Nalinnes le 15/10/08.
Photo : Fanny Ellis.*

Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*) : Un premier migrateur trahit sa présence par son cri nasillard le 25/09 à Hemptinne. D'autres isolés vont se succéder jusqu'à la fin du mois ; ce beau fringille est contacté le 26 à Florennes, et à nouveau les 27 et 29 à Hemptinne. Les troupes de ce migrateur nordique sont difficiles à quantifier car il s'associe souvent avec l'espèce précédente. En octobre, 4 ex. survolent Mariembourg le 08. A la fin du mois, des petits groupes de 2 à 20 ex. sont remisés dans des tournières à Clermont-lez-Walcourt. Les stationnements se poursuivent en novembre. Plusieurs dizaines d'individus le 02/11 à Mariembourg font la navette entre les chaumes de maïs et des haies d'épineux. Par la suite, on signale 36 ex. le 07/11 à Hemptinne et des petits groupes remisés à Roly jusqu'à la fin du mois.

Serin cini (*Serinus serinus*) : Ce petit fringille en expansion vers le Nord est peu noté au passage. 4 mentions pour ces 3 mois. 3 données se rapportent à Mariembourg avec 3 ex. le 03 et le 17/09 exploitant des armoises vulgaires. Un dernier sujet y est entendu en vol le 10/10. Ailleurs, un ex. stationne le 25.09 à Hemptinne.

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) : Trois groupes sont renseignés en septembre, 100 ex. à Daussois et 25 ex. à Saint-Aubin le 11, 15 ex. le 23 aux BEH. En octobre, des petites volées fréquentent les tournières agricoles sur le plateau de Clermont-lez-Walcourt. Trois citations en novembre dont 40 ex. le 17 aux BEH.

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) : Aucune troupe importante durant cette période. Cette belle espèce est contactée dans une dizaine de localités. 10 ex. se laissent admirer dans un saule le 08/09 à Treignes. Vers la mi-septembre, on nous signale 20 ex. le 12 et 25 ex. le 15 à Hemptinne, 11 ex. sont identifiés le 24 à Flavion. Ce fringille souvent convoité des tendeurs est repéré en novembre par petits groupes à Virelles et Morialmé. On termine ce tour d'horizon avec 15 ex. le 15 à Romedenne et 10 ex. à la fin du mois dans une friche à Couvin.

*Verdier d'Europe, Nalinnes, le 15/10/08.
Photo : Fanny Ellis.*



Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*) : Durant la mauvaise saison, ce petit granivore verdâtre est surtout inféodé aux aulnes glutineux. Les troupes les plus significatives sont comptées à Petite-Chapelle avec 110 ex. le 22 et 60 ex. le 24/10. Des volées plus réduites s'observent ailleurs : 30 ex. le 6/11 à Vierves-sur-Viroin, 20 ex. à la mi-novembre à Romedenne et un minimum de 25 ex. à Virelles à la fin de ce mois.

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) : Les rassemblements post-nuptiaux ne passent pas inaperçus. Dès la mi-septembre, des troupes étoffées s'abattent sur les terres condruziennes : 200 ex. sont comptés le 15 à Hemptinne, 100 ex. le même jour à Jamagne, 100 ex. le 19 à Chaumont, 100 ex. le 24 à Rosée et 70 ex. de nouveau à Jamagne le 26. En octobre, plus au sud, 50 ex. stationnent le 10 à Forges. 30 ex. transitent par Virelles le 19 et un petit contingent (15 ex.) traîne à Mariembourg le même mois. Aucune queue de migration n'est notée en novembre.

Sizerin flammé (*Carduelis flammea*) : Un petit passereau à la queue courte décortique les cônes séchés d'un bouleau. Une coiffe comme une goutte de sang et un plumage givré, pas de doute, revoici le sizerin flammé. 11 données pour ce fringille durant cet automne. Plusieurs oiseaux sont repérés le 03/10 à Brûly-de-Couvin. Il faut attendre novembre pour surprendre 1 ex. le 10 à Treignes et 1 ex. le lendemain à Olloy-sur-Viroin. 2 ex. sont identifiés en vol le 14 aux BEH. Présent à Mariembourg dès la mi novembre avec 2 ex. le 14, 1 ex. le 19, 15 ex. le 27 et 2 ex. le 29. Signalons une troupe de 22 sujets à Mont-sur-Marchienne le 26. Encore mieux, 28 ex. les 28 et 29 à Nismes. 2 derniers oiseaux sont vus le 30 à Yves-Gomezée.

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*) : Année sans relief pour ce conirostre imprévisible dans ses déplacements. 5 mentions comme l'automne précédent. Un premier oiseau crie en vol le 28/09 à Olloy-sur-Viroin. En octobre, au moins 1 ex. est entendu le 04 à Hemptinne. Un maximum de 11 ex. migre vers le Sud-Ouest le 20 à Saint-Aubin, 1 isolé survole Mariembourg le 21 et une seule mention en novembre avec 1 ex. à Couvin le 17.

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) : Aucun groupe renseigné ne dépasse la dizaine d'ex. Pas d'individus dits "trompettants" durant cette chronique.

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) : Rien de bien particulier pour ce passereau au bec massif. Renseigné dans 11 localités différentes avec tout au plus un groupe de 9 ex. le 24/10 à Saint-Aubin.

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) : Dès l'automne, l'espèce retrouve son comportement grégaire et s'observe en bandes dans les campagnes ouvertes parsemées de haies. En dehors des isolés et des groupes restreints, on note 21 ex. le 21 et 40 ex. le 25/09 à Hemptinne. Un minimum de 50 ex. séjournent à Fagnolle au début d'octobre. A la fin de ce même mois, une trentaine d'ex. sont signalés à Clermont-lez-Walcourt. Une seule mention mais importante en novembre avec une belle troupe d'une centaine d'ex. remisés dans une éteule le 30 à Yves-Gomezée.

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) : Uniquement des isolés sont contactés en septembre avec un premier migrateur entendu le 15/09 à Hemptinne. Pas de comptage ni de troupes importantes en octobre : on peut signaler un chanteur le 17 à Virelles et 12 ex. le 30 à Clermont-lez-Walcourt. En novembre, tout au plus 3 individus les 01 et 02 à Mariembourg et un sujet à Virelles le 17 et le 19.

Liste des observateurs: *Adriaens Véronique, Appels Diane, Baeten Stijn, Barbusca Franco, Bayot André, Berwaer Monique, Biquet Luc, Boche Jean-Marie, Boux Kurt, Brihaye Jean-François, Brousmiche Charles, Buchet Véronique, Carbonnelle Sébastien, Chapelle Goderfroid, Claerebout Stéphane, Collaerts Peter, Corhay François, Coster Jean, Crabbé Daniel, Cremelie Martine, Crépin Laurent, Damman Erik, De Broyer Alain, De Moor Ward, Debiève Jony, Debusschere Klaas, Deflorenne Philippe, Demey Jeremy, Deroueaux Antoine, Deschepper Chantal, Dewitte Thierry, Dordolo Charles, Dufourny Hugues, Ellis Fanny, Ellis Rees, Engelen Peter, Evrard Jacques, Fays Cécile, Formation ornitho, Gilles Benoît, Goedertier Wouter, Hanouille Sebastiaan, Hanus Bernard, Ittelet Michel, Lambert Marc, Laudelout Arnaud, Laurent Jean-Marc, Lebrun Raphaël, Leclef Philippe, Lecohier Didier, Leirens Vincent, Lewylle Iwan, Maes Filiép, Marchi Mandy, Matagne Jacques, Orbant Dominique, Paquet Alain, Paquet Jean-Yves, Périkel Alexandre, Piette Agnès, Piette Alain, Pierret Sébastien, Renson Sébastien, Rossignon Philippe, Sansdrap Anne, Schenkel Daniel, Selcuk Yildiz, Simonart Gaëtane, Simonart Jacques, Swaen Luc, Titriaux Martin, Van Ginderdeuren Karl, Vandewiele Tim, Vanmeerbeeck Philippe, Vercruyse Andries, Vicenzi Henry*



Grandes Aigrettes et Chat sauvage, Virelles, le 21/09/08. Photo : Jean-Yves Schohy.

Le Chat sauvage (*Felis silvestris*), bien que rare, est encore répandu dans le sud de l'ESEM. Celui-ci a été surpris, le 21/09/2008, tôt le matin, dans les brumes de l'étang de Virelles. A l'arrière plan, deux Grandes Aigrettes. Moment d'émotion intense...

QUELQUES ADRESSES SUR LA GRANDE TOILE

Vous pouvez visiter le blog d'Olivier Colinet où se trouvent de nombreuses photos d'oiseaux de la région et aussi des aquarelles: <http://olivier-colinet.skyrock.com>

Un autre lien transmis par Bertrand Posse ("Nos oiseaux" LPO Suisse) : Le quatrième numéro de "Vos Oiseaux" (novembre 2008) vient de paraître.

<http://www.ornitho.ch/pdffiles/newsletter/vosoiseauxnov08v2-5224.pdf>

Une fenêtre sur le diaporama "*E.aurinia*" (Damier de la succise) de Jean Delacre en le réglant sur 7 secondes(bas d'image) :

<http://picasaweb.google.com/jean.delacre/EuphydryasAuriniaLeDamierDeLaSucciseFagnes#slide-show>

Nos collègues du Brabant wallon sortent leur premier "*Bruant wallon*" :

<http://www.natagora.be/index.php?option=content&task=view&id=461#ornitho>

AVIFAUNE

Premières observations du Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*) dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse

Par Philippe Deflorenne

Le 01 septembre 2008 vers 18h30, j'arrête mon véhicule au bord du pré-barrage de Falemprise (BEH), un bon endroit pour l'observation des oiseaux d'eau. Deux sarcelles d'été, deux Canards chipeaux, une nichée tardive de Fuligules morillons... Dans le pré, juste à côté, un petit héron blanc trotte entre les pattes des vaches. A plusieurs reprises, il engloutit des proies offertes par le piétinement des ruminants. Une vache, sans doute peu habituée à la présence de l'intrus, lui fait la chasse à deux reprises. Cela ne semble pas beaucoup l'inquiéter. La fermière, invisible à mes yeux, bat le rappel. Le bétail prend alors le chemin des étables. Notre petit visiteur s'envole et après un essai infructueux se pose sur une branche morte au pied de l'eau juste en dessous du dortoir de Grands Cormorans. C'est là que je le laisse, sans doute va-t-il passer la nuit...

Le lendemain matin, il avait disparu et ne sera pas revu les jours suivants.



*Photo 1. Héron garde-boeufs juvénile. Un des oiseaux nés à Harchies? BEH, le 01/09/2008.
Photo : Philippe Deflorenne.*

A partir du 13 novembre, de un à deux individus seront observés régulièrement au même endroit. Ils se nourrissent abondamment de vers de terre aux pieds des vaches. Un des deux oiseaux est un

adulte avec le bec plus orangé que l'autre et la calotte légèrement teintée de fauve, l'autre a le bec plus terne et est parfaitement blanc, donc un juvénile (voir photos 2 et 3).



Photos 2 et 3. Hérons garde-bœufs. (Falemprie)BEH, le 13/11/2008. Photos : Bernard Hanus.

Comment le reconnaître ?

Le Héron garde-bœufs marque souvent les mémoires. C'est ce petit héron blanc qui, comme son nom l'indique, accompagne les troupeaux de grands mammifères. A l'origine, il était lié à la grande faune africaine (éléphants, buffles, zèbres, ...) et s'est progressivement adapté aux mammifères domestiques (vaches, chevaux, ...).

Sa quête de nourriture se passe la plupart du temps au sol où il s'intéresse à toutes les bestioles dérangées par le bétail. Sa nourriture est essentiellement constituée d'insectes : criquets, sauterelles, coléoptères, ... mais aussi des mollusques, lézards, grenouilles, araignées, ... Il arrive régulièrement qu'il se poste sur le dos d'une bête et qu'il la débarrasse d'un parasite mais ça ne semble pas être la règle.

Il occupe donc généralement des endroits riches en pâturages mais adore aussi la proximité de milieux aquatiques pour sa nidification ou comme gîte nocturne.

L'espèce est généralement sédentaire sur une grande partie de son aire de répartition. Néanmoins, elle craint le froid et peut donc opérer des mouvements. Les jeunes oiseaux se dispersent assez régulièrement, après leur émancipation.

Trapu et de taille relativement modeste pour un héron, le garde-boeufs mesure de 45 à 52 cm entre la pointe du bec et le bord de la queue, pour une envergure de +/- 85 cm. Son plumage est uniformément blanc sauf en période nuptiale où il revêt une teinte orangée sur la tête, la poitrine et le dos. Il possède un bec court de couleur jaune (voir photos 2 et 3) à rose orangé en période nuptiale. Chez le juvénile, le bec est noir et devient progressivement jaune comme c'est le cas chez l'individu observé le 01/09 (voir photos 1 et 4). Son cou est assez court, il le rentre volontiers dans les épaules. Sa tête est ronde. Ses pattes sont uniformément grisâtres, s'éclaircissant lors de la nidification.

Mais attention, depuis quelques années, différentes espèces de « hérons blancs » se rencontrent de plus en plus couramment dans nos campagnes.

La Grande Aigrette (*Egretta alba*) se distingue facilement par sa taille imposante très voisine de celle du Héron cendré (*Ardea cinerea*).

L'Aigrette garzette (*Egretta garzetta*), de corpulence à peu près identique, se reconnaît par son bec noir en toutes saisons et nettement plus long que chez le garde-boeufs. Elle est plus élancée que ce dernier avec un cou plus long. Si ses pattes sont noires, ses doigts sont immanquablement jaunes (voir photo 5) ce qui la distingue à coup sûr des autres espèces voisines. En période nuptiale, elle revêt deux très longues fines plumes à la nuque (encore un peu visible sur l'oiseau de la photo 5). Bien que nichant parfois à proximité du garde-boeufs, la garzette cherche sa nourriture dans des milieux plus humides : des pièces d'eau peu profondes, le long des côtes, des marais, ...



Photo 4. Héron garde-boeufs juvénile. BEH, le 01/09/2008. Photo :Philippe Deflorenne.



Photo 5. Aigrette garzette. Virelles, le 26/08/2007. Photo :Philippe Deflorenne.

Statut de l'espèce

Trois sous-espèces sont actuellement reconnues pour le Héron garde-boeufs, elles diffèrent entre elles par la taille, l'intensité du rouge dans le plumage nuptial,... :

- *ibis* : Afrique, Europe jusque la mer Caspienne, Amérique ;
- *seychellarum* : Seychelles ;
- *coromanda* : sud et est de l'Asie, Australie, Nouvelle-Zélande.

Le Héron garde-boeufs a étendu de manière incroyable son aire de répartition au cours du 20^e siècle. Originellement lié aux zones tropicale et subtropicale de l'Ancien Monde, il va profiter de l'extension des terres irriguées et de l'intensification de l'élevage. Il part littéralement à la conquête du monde :

- Dans les années 1930, parti des côtes africaines, il arrive en Guyane après un périple de 2850 km. Il a aujourd'hui colonisé toute l'Amérique du Sud à l'exception de la cordillère des Andes pour son climat trop rude. Les îles Galapagos (Pacifique) sont même atteintes en 1964.
- En 1953, il met la patte en Amérique du Nord. La Floride sera son premier port d'attache.
- En 1962, ce sera le tour du Canada

- Du côté asiatique, l'espèce va également gagner des territoires. La Chine, la Corée du sud, le Japon et l'Australie (via la Nouvelle Guinée) seront atteints au début du 20e siècle.
- En 1963, la Nouvelle Zélande est conquise.
- En Europe, l'espèce était sans doute déjà présente dans le sud de l'Espagne au 16e ou 17e siècle mais avait disparu de nombreux sites avant qu'elle ne parte à la reconquête du pays dans les années 1950.
- En 1969, 2 couples se reproduisent avec succès pour la première fois en Camargue. Au lac de Grand-Lieu, dans l'ouest de la France, l'espèce se reproduit pour la première fois en 1981.
- L'Italie est atteinte en 1985.

Et en Belgique...


- Un premier individu est observé le 10 juin 1969 au Zwin (Knokke).
- Un premier exemplaire wallon est observé le 20 avril 1983 aux marais d'Harchies. Une interrogation subsiste néanmoins sur l'origine sauvage de ces oiseaux. Certains lâchers (Alsace,...) laissent planer un doute.
- En 1997, première nidification nationale au Zwin (1998 pour les Pays-Bas).
- En 2008, première nidification wallonne aux marais d'Harchies.
- Le 01 septembre 2008, première apparition un peu tardive mais attendue dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Perspectives d'avenir


Bien qu'ayant conquis une grande partie du territoire potentiel, le Héron garde-bœufs a sûrement encore quelques possibilités d'extension, en Belgique notamment. Il est donc fort à parier que cette première observation dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse sera la première d'une longue série.

Pour en savoir plus...

- BRONNE L. (2008). Ils ont niché chez nous! Natagora n°27. Septembre-octobre 2008.
- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & SARGATAL, J. (1992). *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona.
- GEROUDET P. (1978). Grands Echassiers, Gallinacés, râles d'Europe. Delachaux & Niestlé, Suisse.
- HAGEMEIJER E. J. M. & BLAIR M. J. (Editors) (1997). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their Distribution and Abundance*. T. & A.D. Poyser, London.



Donnée de baguage intéressante



Le 06/09/2004, Didier Lecohier découvrait le cadavre d'un Gobemouche noir sur un parking à Donstiennes. Celui-ci portait une bague. La réponse nous est parvenue récemment. L'oiseau avait été bagué pullus le 26/06/2004 à Averoya en Norvège (Coordonnées : 60°06'N 10°11'E).

MIGRATION DU PLUVIER GUIGNARD

Bernard Hanus décrit son suivi des Pluviers guignards de cet automne...

Cette année 2008 est exceptionnelle à Clermont-lez-Walcourt pour le Pluvier guignard : j'en suis à 84 ex. observés avec des oiseaux 15 fois en 18 sorties!!!

15/08 1 ex. adulte en passage actif
17/08 15 ex. en 2 groupes au sol (6 ex. adultes + 1 juvénile et 8 ex. adultes)
18/08 (7) ex.
21/08 22 ex. en 3 groupes (2 adultes en passage actif, 5 + 15 adultes au sol)
22/08 (15) ex.
23/08 6 ex. au sol (5 adultes et 1 juvénile)
24/08 (6) ex. + 1 ex. au sol (6 adultes et 1 juvénile)
25/08 1 ex. adulte au sol
26/08 22 ex. en 2 groupes au sol 4 ex. (2 adultes et 2 juvéniles) et 18 ex. (12 ad. et 6 juv.)
27/08 (11) ex. au sol (6 adultes et 5 juvéniles)
28/08 6 ex. au sol (5 adultes et 1 juvénile)
29/08 0
30/08 3 ex. au sol (2 adultes et 1 juvénile)
31/08 0
01/09 3 ex. au sol (2 adultes et 1 juvénile)
02/09 (3) ex. au sol (2 adultes et 1 juvénile)
03/09 0
04/09 4 ex. au sol (2 adultes et 2 juvéniles)
Total: 84 ex. pour 69 adultes et 15 juvéniles (les données entre parenthèses concernent des oiseaux déjà observés la veille).



A noter que je n'ai pu faire que 4 matinales ce qui est pourtant de loin le plus important pour le guignard, ils "tombent" souvent le matin pour repartir dans la journée. Le reste des observations se faisait en 1h30 le soir sauf les dimanches après-midi.

Le plateau et le mont de Viscourt sont les endroits de passage idéaux mais ils ne comportaient pas de champs adéquats cette année.

Heureusement pour moi, 2 champs de colza grossièrement labourés offraient le faciès idéal durant toute la période et étaient relativement correctement placés sur la voie de migration.

Mon plus grand groupe comptait 18 ex. J'ai contacté des oiseaux dans 6 champs différents sur le secteur ce qui doit être un record. Un des champs de colza ne sera visité que par 2 groupes mais il totalisera le maximum d'oiseaux : 33 ex. L'autre champ de colza sera visité par 7 groupes mais ne totalisera que 25 ex. Les 4 autres champs ne seront visités chacun que par un groupe. Voilà un bref aperçu de l'automne le plus passionnant pour le suivi de cette espèce en 15 ans sur ce site même si le record de 1994 (92 ex.) ne fut pas atteint.

Depuis 2005 (2004 déjà à Bonneffe) les automnes favorables s'enchaînent, le guignard serait-il en augmentation? Cette année est évidemment hors norme (plus de 150 ex. au total à Burdinnes) ; mais pour ma part depuis 2005, j'en contacte à chaque sortie matinale "dans les dates" ce qui était loin d'être le cas antérieurement. Il me semble que la météo n'explique pas tout même si elle y est pour beaucoup en 2008 évidemment.



Pluviers guignards en vol, Clermont-lez-Walcourt, le 17/08/2008. Photos : Bernard Hanus.

AGENDA

GRENOUILLES SUR LES ROUTES

VENEZ LES DÉCOUVRIR et participez à une OPÉRATION DE SAUVETAGE



Samedi
21 février

Virelles : Exposé illustré par un montage Powerpoint et projection suivis d'une sortie nocturne. RDV à l'Aquascope à 18h30 - fin des activités vers 22h. Animation gratuite et création d'une brigade « **Grenouilles & Compagnie** ».


Chouettes soirées

En mars, Natagora organise les "**Chouettes soirées**", un programme de promenades nocturnes destinées à faire mieux connaître chouettes et hiboux. Dans une vingtaine de lieux dont Virelles : conférences, montages dias, films et sorties de découverte crépusculaires ou nocturnes.



Samedi 14 mars : Exposé et projection suivis d'une sortie nocturne.



Rendez-vous à l'Aquascope à 19h00. Fin des activités vers 22h. Animation gratuite.



Parc naturel Viroin-Hermeton

Vendredi 13 mars 2009
A 20 heures précises

LA MALADIE DE LYME...

Maison des Baillis
Maison du Parc naturel
rue d'Avignon, 1
Nismes (Viroinval)

Philippe MARTIN,
Bactériologiste et Chargé de cours au Centre
universitaire du Troisième Age de Namur
(UTAN)


Présentera :

- un exposé et un montage powerpoint sur

“ La Borréliose de Lyme, un modèle d'intégration écologique ”


et répondra à vos diverses questions.

CONFERENCE



Entrée libre


Renseignements :
+32(0)60 39 17 90
www.pnvh.be
secretariat@pnvh.be



Chouette Nature a.s.b.l. Parc naturel Viroin-Hermeton

Samedi 14 mars 2009
A 19 heures précises

8^e Nuit de la Chouette




Maison du village
rue de Fagnolle, 33
DOURBES
(Viroinval)

- Accueil
- Information
- Projection
- Animation
- Balade nocturne
- Drink convivial

**Places limitées !
Inscription souhaitée**

ACTIVITE NATURE



Entrée libre

Renseignements et inscriptions:
Chouette Nature asbl : 060/ 31 24 14
Maison du Parc : 060/ 39 17 90
secretariat@pnvh.be

Vendredi 20 mars, Nismes (Viroinval)

Réunion spéciale observateurs et naturalistes du sud de l'ESEM de La Grièche, centrale ornithologique.

Invitation cordiale à tous !

Nous vous proposons :

- « **Des sternes nicheuses à Virelles ? Pari gagnant!** », par Sébastien Pierret;
- « **Suivis hivernaux de la grande aigrette** », par Cédric Groult;
- « **1998-2008, bilan des dix années de la cellule « vergers » du PCDN de Viroinval** », par Thierry Dewitte.

R.V. : **20h**, ferme de la Maladrie dite du Petit Julien, à Nismes (200m après le rond-point à l'entrée du village en venant de Mariembourg).

Info : Thierry Dewitte (0476/ 75 25 37)

Org. : Natagora ESM et Viroinval CNB.

Vendredi 24 avril, Nismes (Viroinval)

Les papillons migrants

Qui n'a pas observé un vulcain ou un machaon en se promenant ou en jardinant ? Mais savez-vous que ce bel insecte a peut-être fait plusieurs centaines de kilomètres juste avant que vous ne le regardiez ? Pourquoi migre-t-il ? Quels autres papillons, de jour ou de nuit, sont concernés ? Comment les observer et les attirer dans son jardin ? Ou les étudier ? Exposé illustré grâce des cadres didactiques et à une projection de diapos. Bienvenue à tous !

Exposant et conférencier : **Marcel Gillard**

R.V. : **19h30**, ferme de la Maladrie dite du Petit Julien, à Nismes (200m après le rond-point à l'entrée du village en venant de Mariembourg).

Info : Thierry Dewitte (0476/ 75 25 37)

Org. : Natagora ESM et Viroinval CNB.



Parc naturel Viroin-Hermeton
Vendredi 3 avril 2009
A 20 heures précises

PAPILLONS et nos jardins

CONFERENCE

Maison des Baillis
Maison du Parc naturel
rue d'Avignon, 1
Nismes (Viroinval)

Stéphane CLAEREBOUT,
Naturaliste chevronné,
Assistant au
Centre Marie-Victorin

Présentera :

- un montage powerpoint sur les papillons et les aménagements que vous pouvez réaliser dans votre jardin afin de favoriser leur présence.
- divers ouvrages :
 - * Clé de détermination des papillons de jour *
 - * Atlas des papillons de jour de Wallonie *, etc...

et répondra à vos diverses questions.

Renseignements :
+32(0)60 39 17 90
www.pnvh.be
secretariat@pnvh.be

Entrée libre

Dimanche 19 avril :

Journée des hirondelles



Le dimanche 19 avril, l'Aquascope Virelles, vous propose une journée consacrée à la découverte de nos trois espèces d'hirondelles, intégralement protégées par la loi mais se raréfiant de plus en plus.

Comment les reconnaître ? Que faire pour les aider devant les nombreuses menaces pesant sur leurs habitats traditionnels ? Nul besoin d'être ornithologue pour les découvrir et les apprécier !

Samedi 28 mars :

Verger, taille et plantation

Dans le cadre des activités du PCDN et du GAL de la Botte du Hainaut, nous organisons le samedi 28 mars, de 14 h à 17h, un atelier pratique sur le terrain pour vous aider à tailler, planter et entretenir un verger haute tige ou demi tige. Il se tiendra dans le verger situé **rue du Falin à Leval Chaudeville**, derrière les établissements Bombled. Ce verger a été planté en 2002 de variétés anciennes telles que la



Rambour d'hiver, la Reinette étoilée, la Reinette de France, la Qwastresse double, ...

Amenez votre sécateur, il vous sera possible de vous entraîner ! Participation gratuite !

Vendredi 1^{er} mai

Balade gourmande



Le vendredi 1^{er} mai, la nature sera gourmande à l'Aquascope Virelles et la cuisine sera sauvage... Tout le long d'un superbe circuit pédestre, diverses haltes gustatives vous seront proposées pour éveiller vos papilles à la cuisine sauvage. Apéritifs, entrées, plats et desserts, tous bénéficieront des saveurs originales de nos meilleures plantes comestibles. Au fil des kilomètres, les plantes qui jalonnent les chemins se retrouveront ... dans votre assiette, accommodées par notre chef, à sa manière ou à la vôtre. Bref, une superbe journée, à partager en famille ou entre amis, pour redécouvrir les plaisirs simples d'une nature belle et généreuse.

Dimanche 31 mai

Le CREAves vous ouvre ses portes



Le 31 mai, les infrastructures du CREAves seront exceptionnellement ouvertes au public et plusieurs visites seront organisées et commentées par nos soigneurs. Une occasion unique de découvrir nos installations, nos pensionnaires

et d'appréhender le fonctionnement du centre de revalidation de Virelles.

Par la suite, le centre ne sera plus visitable pour assurer la parfaite quiétude des oiseaux et mammifères bénéficiant de soins !



by Doug MacGregor



**Je ne vois pas un piaf,
et toi?**

ETHOLOGIE

LE CALENDRIER DES OISEAUX

Par Paul Gailly
Relecture Thierry Dewitte
et le comité de rédaction de "la Grièche"

Le comité de rédaction de "la Grièche" remercie particulièrement Paul Gailly pour nous avoir permis de publier ce tableau qui reprend les mouvements de nos différentes espèces d'oiseaux. La relecture de celui-ci est sûrement une des plus délicate qu'il nous a été donnée à ce jour tant chaque espèce présente régulièrement des divergences par rapport à la "norme". Nous nous sommes donc efforcés de nous en tenir aux schémas classiques. C'est pourquoi, par exemple, la Grive musicienne n'est pas "coloriée" comme hivernante alors que son statut est mis en sédentaire ou partiellement sédentaire. En effet, les effectifs de cet oiseau, l'hiver, sont tellement faibles par rapport à l'été qu'il nous a semblé inutile de le laisser comme hivernant classique. On comprend, par cet exemple, que les choix ont souvent été délicats. Ce tableau a pour but de donner, à l'ornithologue débutant ou confirmé, la possibilité d'avoir une vue globale sur le calendrier de telle ou telle espèce, de savoir si ce qu'il observe est dans la norme ou non et dans ce dernier cas s'il doit être plus vigilant qu'en d'autres temps. Pour tout complément d'information il faudra alors se référer à des monographies plus complètes.

En ce qui concerne les périodes de nidification, la zone couverte est principalement la Wallonie. Les remarques précédentes valent aussi pour les nicheurs. Certains nouveaux arrivés n'ont pas été mis comme tels du fait du côté anecdotique (pour l'instant), comme la Nette rousse ou le Fuligule nyroca. Idem pour d'autres disparus ou localisés comme le Chevalier guignette ou le Merle à plastron.

Le tableau initial résulte de la compilation d'informations provenant des ouvrages suivants :

- Les "*chroniques ornithologiques*" et les "*observations récentes*" publiées dans le Bulletin Aves pour les années 1993 à 1998.
- *Le guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental* de Mark Beaman et Steve Madge (un peu frustrant du point de vue comportemental mais très intéressant au niveau des cartes et des espèces présentées) publié chez Nathan (1998).
- Les "Géroudet" (un peu frustrant au niveau des cartes mais très intéressant du point de vue comportemental) publié chez Delachaux et Niestlé.
- *Oologia belgica* de René Verheyen publié par l'IRSNB (1967) et qui reste une source d'informations remarquable.
- *L'Atlas des oiseaux nicheurs de Belgique* de Pierre Devillers *et al* (IRSNB, 1988) qui reste très intéressant si on garde en tête que l'enquête de terrain a 25 ans.
- *Les nids, les œufs et les poussins d'Europe en couleurs* de Colin Harrison (Elsevier 1977) (épuisé mais réédité en anglais par New Edition).

PHENOLOGIE DES OISEAUX

	Présence hivernale	St.	Jan.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Plongeon arctique	E		■	■	■	■		■	■	■			■	■
Plongeon catmarin	E		■	■	■			■	■	■			■	■
Plongeon imbrin	E		■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Grèbe castagneux	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grèbe huppé	E-AN	S			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grèbe jougris	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grèbe esclavon	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grèbe à cou noir	E-AN	S				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grand Cormoran	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grand Butor	E	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blongios nain	ASS				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Héron gardeboeuf	E-AN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Héron bihoreau	ASS		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Héron cendré	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Héron pourpré	ASS				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cigogne noire	ASS			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cigogne blanche	ASS		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spatule blanche	ASS			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cygne de Bewick	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cygne sauvage	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oie cendrée	E-AN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oie rieuse	E-AN			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oie des moissons	E-AN			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bernache nonnette	EN			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bernache cravant	EN			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tadome de Belon	E-AN	S		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canard siffleur	E-AN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canard chipeau	E-AN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sarcelle d'hiver	E-AN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canard colvert	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canard pilet	E-AN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sarcelle d'été	ASS			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canard souchet	E-AN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nette rousse	ES			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fuligule milouin	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fuligule nyroca	ES-AN	(..)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fuligule morillon	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fuligule milouinan	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eider à duvet	EN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garrot à œil d'or	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Harle piette	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Harle huppé	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Harle bièvre	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	Présence hivernale	St.	Jan.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Bondrée apivore	ASS													
Milan noir	ASS													
Milan royal	E-AN	(..)												
Busard des roseaux	E-AN													
Busard St Martin	E-AN													
Busard cendré	ASS													
Epervier d'Europe	E-AN	S												
Buse variable	E	S												
Buse pattue	EN													
Balbusard pêcheur	ES-AN													
Faucon crécerelle	E-AN	S												
Faucon émerillon	E-AN													
Faucon hobereau	ASS													
Faucon pèlerin	E-AN													
Caille des blés	(ES-AN)													
Râle d'eau	E-AN	S												
Marouette ponctuée	M-ASS													
Râle des genêts	ASS													
Poule d'eau	E-AN	S												
Foulque macroule	E-AN	S												
Grue cendrée	E-AN													
Huîtrier pie	E-AN	S												
Echasse blanche	AN-ASS													
Avocette élégante	E-AN	S												
Petit Gravelot	ASS													
Grand Gravelot	E-AN	(..)												
Pluvier doré	E-AN													
Pluvier argenté	E-AN													
Vanneau huppé	E-AN													
Bécasseau maubèche	E-AN													
Bécasseau sanderling	E-AN													
Bécasseau minute	ASS													
Bécasseau de Temminck	ASS													
Bécasseau cocorli	ASS													
Bécasseau variable	E-AN													
Combattant varié	E-AN	(..)												
Bécassine sourde	E-AN													
Bécassine des marais	E-AN													
Bécasse des bois	E-AN	S												
Barge à queue noire	E-AN													
Barge rousse	E-AN													
Courlis corlieu	(E-AN)-ASS													

	Présence hivernale	St.	Jan.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Rossignol philomèle	ASS													
Gorgebleue à miroir	ES-AN													
Rougequeue noir	E-AN	S												
Rougequeue à front blanc	ASS													
Tarier des près	ASS													
Tarier pâtre	E-AN	S												
Traquet motteux	ASS													
Merle à plastron	E-AN													
Merle noir	E-AN	S												
Grive litorne	E	S												
Grive musicienne	E-AN	S												
Grive mauvis	E-AN													
Grive draine	E-AN	S												
Locustelle tachetée	(AN)-ASS													
Locustelle lusciniöide	ASS													
Phragmite des joncs	ASS													
Rousserolle verderolle	ASS													
Rousserolle effarvate	ASS													
Rousserolle turdoïde	ASS													
Hypolaïs icterine	ASS													
Hypolaïs polyglotte	ASS													
Fauvette babillarde	(AN)-ASS													
Fauvette grisetle	ASS													
Fauvette des jardins	ASS													
Fauvette à tête noire	E-AN	(S)												
Pouillot siffleur	ASS													
Pouillot véloce	E-AN	(S)												
Pouillot fitis	ASS													
Roitelet huppé	E	S												
Roitelet triple-bandeau	E-AN	S												
Gobemouche gris	ASS													
Gobemouche noir	ASS													
Panure à moustaches	E	S												
Mésange noire	E-AN	S												
Mésange bleue	E-AN	S												
Mésange charbonnière	E-AN	S												
Rémiz penduline	E													
Loriot d'Europe	ASS													
Pie-grièche écorcheur	ASS													
Pie-grièche grise	E-AN	S												
Geai des chênes	E-AN	S												
Choucas des tours	E	S												

	Présence hivernale	St.	Jan.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Corbeau freux	E	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etourneau sansonnet	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Moineau domestique	E	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Moineau friquet	E	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pinson des arbres	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pinson du nord	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Serin cini	E-AN	(.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verdier d'Europe	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chardonneret élégant	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tarin des aulnes	E-(AN)	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Linotte mélodieuse	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sizerin flammé	E		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant jaune	E	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant ortolan	ASS		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant des roseaux	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant proyer	E-AN	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Légende

- Période de présence régionale
- Période de migration
- Pic de migration
- Période de reproduction chez nous
- Période de reproduction ailleurs

E Europe
EN Nord de l'Europe
M Bassin méditerranéen
AN Afrique au nord du Sahara
ASS Afrique au sud du Sahara
S Population sédentaire ou
(.) Susceptibilité de présence hivernale



CARNETS NATURALISTES D'ANNE SANSDRAP

Une infinie douceur...

Virelles, samedi 11 octobre. L'automne hésite ces derniers jours entre déluge et infinie douceur. Aujourd'hui, le soleil, qui nous a été promis, a bien du mal à percer et à effacer le brouillard. Quelques timides rayons illuminent brièvement l'étang en début d'après-midi...

Un hôte de marque est de sortie... Un hôte qui se laisse très peu observer à Virelles depuis quelques années... Le Butor étoilé ! Philippe l'a repéré ce matin et avant notre réunion, nous profitons tous de cette observation « trois étoiles ». Un peu frustrant de le quitter...

Deux heures et demi plus tard, nous le retrouvons au même endroit, perché à un mètre au-dessus de l'eau. Sous son poids, les tiges se courbent et, tout comme dans la fable, le roseau plie... mais ne rompt pas. A ses pieds se prosterne un petit peuple composé de Canards souchets, Fuligules milouins et Grèbes castagneux. L'oiseau effectue délicatement sa toilette et j'en profite pour admirer sa calotte et sa moustache sombres ainsi que son plumage écailleux. A la manière d'un serpent sous le charme d'un joueur de flûte, il se redresse et étend lentement le cou en ondulant. Puis il se retire et disparaît dans l'enchevêtrement de roseaux...

C'est l'unique représentant de la famille des Hérons sur le site à l'exception d'un Héron cendré

qui survole l'étang. Quel contraste par rapport à il y a trois semaines ! Les mangeurs de poissons se sont regroupés aux abords de l'île : une cinquantaine de Grands Cormorans s'y reposent dans les arbres alors qu'un groupe de quatorze Grèbes huppés font la sieste au gré de l'eau.

Le Seigneur des Marais vient de regagner sa touffe de roseaux favorite pour un repos prolongé, bec dans les plumes. Un drôle d'oiseau vu de dos, sans cou ni tête, parfaitement mimétique à l'exception d'un mince croissant blanc créé par le soulèvement de ses plumes au niveau des épaules. J'entends les cris de trois Bécassines des marais que je n'ai pas vu décoller. Elles viennent sans doute de quitter l'îlot où elles étaient bien cachées dans la végétation. Lapin Blanc, le gestionnaire des lieux, les aurait-il dérangées au cours de sa promenade ???

Lundi. Aujourd'hui, je vais m'offrir le plaisir de quelques heures d'école buissonnière et j'attends avec impatience la levée du brouillard. Le soleil est timide et le ciel se moutonne. Mais la douceur est de mise et pas un souffle pour perturber le miroir d'eau. Les arbres du parc se dénudent peu à peu et je suis accueillie par une légère pluie de feuilles de tilleul sous le chant du rougegorge. Depuis la forêt de Fagne, j'entends les cris grinçants des Geais de chênes...

Sur l'îlot, en fin de matinée, l'heure est à la sieste chez les colverts. Contrairement à leurs cousins souchets, les mâles ont déjà retrouvé toute leur splendeur. Il y a deux jours, j'ai pu les observer parader et s'accoupler. Une vive querelle entre deux Cygnes tuberculés les réveille et tout ce petit monde se met à l'eau.

A l'autre extrémité de l'île, loin de cette agitation, une Bécassine des marais prolonge le repos, bec enfoui dans les plumes. J'aperçois toutefois ses clignements de paupière et de temps en temps un léger mouvement de la tête, preuves qu'elle est bien attentive à tout ce qui l'entoure. J'en découvre une autre, qui fait sa toilette, bien camouflée dans la végétation. C'est le mouvement de son interminable bec et le doré de ses bretelles qui ont trahi sa présence. Elle agite nerveusement le croupion et y passe régulièrement le bec, puis, immobile, elle se confond à nouveau avec le feuillage.

La première entame, elle aussi, une minutieuse toilette, lissant ses plumes par de délicats mordillements du bec. Elle étale largement sa queue rousse barrée de sombre. En fait, elles sont au moins six ...

Arrivée claironnante et atterrissage éclaboussant d'un groupe d'une cinquantaine de Bernaches du Canada... J'aperçois au loin au-dessus de la roselière un vol d'une vingtaine d'oiseaux qui effectuent de curieux et brusques décrochés vers la gauche puis vers la droite. A mon grand étonnement, ce sont aussi des Bernaches.

Accueillies par les cris du premier groupe, elles hésitent un instant puis font une large boucle pour se poser. Ensuite, les débats ont l'air assez agités, animés de klaxonnements et de mouvements de la tête et du cou de haut en bas. Puis c'est le retour au calme... jusqu'à la prochaine discussion !

Tout en observant, j'écoute attentivement les rondes de mésanges et les cris de la sittelle, du troglodyte, du Pic épeiche, du Pic vert et du Roitelet huppé. Comme le rougegorge, le Grimpereau des jardins s'essaie à nouveau au chant. Mais cela semble si maladroit que je pense qu'il s'agit peut-être de jeunes oiseaux qui s'entraînent aux vocalises. Dans le ciel, les passages d'Alouettes des champs et leurs cris roulés sont très réguliers. J'y entends également des Tarins des aulnes, des Choucas des tours et peut-être un Pinson du Nord. C'est comme cela aussi que je repère le Martin-pêcheur : deux ou trois cris me signalent sa présence avant que je ne le voie passer comme une flèche devant le mirador. Il faut à tout instant être à l'écoute...

Nouveau passage à hauteur de l'îlot et il me faut choisir entre la Bécassine des marais qui se dore au soleil et ... le Pipit spioncelle qui arpente les berges caillouteuses. Il me semblait bien l'avoir aperçu ce matin mais sur la rive opposée et parmi le feuillage, je l'avais perdu. Je l'avais aussi cherché sans succès sur les îlots dénudés près du mirador. Le voici bien à découvert ! Tête et manteau brun terne très légèrement strié, sourcil et gorge crème, bec fin à mandibule inférieure orangée, poitrine crème aux stries brunes assez diffuses et pattes sombres... Il progresse en picorant au ras de l'eau et me laisse tout le loisir de l'observer. Et il ne manque pas de croiser... une Bécassine des marais... avant de disparaître...

Petit tour à l'est de l'étang où les Bernaches ont repris leurs bruyants conciliabules. Une Grande Aigrette pour un Héron cendré ; égalité, un point partout ! Dans un premier temps, à l'œil nu, pas grand-chose, il me semble... En fait, au bout du plan d'eau, ça grouille de canards plongeurs, milouins et morillons. Avec aussi quelques

colverts et souchets. Manquant de patience, je les parcours sans trop chercher d'autres espèces parmi ceux-ci... Puis mon cœur se serre car je viens d'apercevoir, je pense, mon canard fétiche ! Est-ce possible à cette saison ??? Ceux qui me connaissent bien vont en rire et ont déjà compris. Vous savez, ce fameux canard que je recherche tout l'hiver et que je suis parfois seule à voir... Serait-ce mon premier Garrot à œil d'or de l'automne ? Entraperçu parmi les fuligules avant une plongée générale et l'envol de certains oiseaux... Hallucination ?

J'enrage... Mais je la retrouve assez vite ma femelle *Bucephala*. Pas de doute ! Bec bicolore, tête chocolat, œil jaune clair et marques blanches sur les flancs. J'étais loin d'imaginer une telle surprise ! Cette découverte me réjouit bien plus que l'observation éventuelle de n'importe quelle rareté du moment, Pouillot à grand sourcil ou Pie-grièche isabelle. Allez comprendre...

Je plonge avec enthousiasme sur mon carnet pour saisir l'instant et je n'ai même pas pris le temps

de profiter de l'observation. Ensuite, impossible de la localiser parmi toutes ces têtes noires et rousses qui sautillent au gré des vagues. Car le vent s'est levé. Je cherche et cherche encore mais ils sont si nombreux... Si elle fait la sieste ou est en pêche, peu de chance de la revoir... Juste avant de quitter l'affût, je finis par la repérer. Elle se toilette, s'ébroue en exhibant son ventre blanc et s'installe bec dans les plumes, tout à fait incognito. Trois observations, je ne l'ai pas rêvée ! J'apprendrai plus tard par Sébastien, qu'il l'avait aperçue très furtivement samedi en vol mais sans être tout à fait sûr vu la brièveté de l'observation. Ni lui, ni Philippe ne l'avaient ensuite revue à l'est de l'étang...

Le soleil a finalement eu raison des nuages. Retour vers le bureau, ma « case départ ». Je risquerais bien d'y prendre goût... à l'école buissonnière !

Anne



Virelles, le 11/10/09. Photo : Anne Sansdrap.

BOTANIQUE

PLANTES RARES OU TYPIQUES DE L'ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE...

LA LIMOSELLE (*Limosella aquatica* L.)


Texte et photo de Philippe Deflorenne



La Limoselle, qu'il ne faut pas confondre avec la Littorelle (*Littorella uniflora* (L.) Aschers.), est comme elle, une plante très discrète. On la trouve sur les berges exondées des étangs, les ornières des chemins ou les mares asséchées. Elle dépasse rarement les 5 centimètres. Les feuilles, toutes partant de la base, sont ovales et très longuement pétiolées. Ce que l'on voit de la plante, c'est généralement une petite touffe verte sur la rive d'un étang. Les fleurs sont encore plus discrètes. Blanches ou roses, solitaires, elles sont vraiment de petites tailles et demandent un examen attentif pour les distinguer.

Les Barrages de l'Eau d'Heure, le 21/08/2004

Au cours du 20^e siècle, cette plante a totalement disparu de nombreuses localités qu'elle occupait. A l'heure actuelle, seuls quelques sites l'hébergent encore en Wallonie. En Entre-Sambre-et-Meuse, les Barrages de l'Eau d'Heure constituent certainement son refuge wallon le plus important. Lors de leur création à la fin des années '70, cette *Scrophulariaceae* y trouve une place de choix pour s'y installer. Adorant les plages alternativement inondées et exondées, elle se développe à foison profitant des mouvements d'eau entre le lac de Plate Taille et celui de l'Eau d'Heure. Alternance liée à la production d'électricité mais aussi de la diminution générale du niveau d'eau de fin d'été, les barrages alimentant la Sambre lors de sa période d'étiage. Bien installée, les meilleures années se sont des milliers de plants que l'on peut apercevoir, particulièrement le long des berges de la Plate Taille. Sa grande discrétion fait que bien peu de personnes lui portent l'attention qu'elle mérite. Aux Barrages de l'Eau d'Heure, elle est, pour l'instant, peu menacée grâce à la gestion particulière des niveaux d'eau.



Répartition en Wallonie de la Limoselle
(<http://biodiversite.wallonie.be/>).

Participez à l'Atlas de la Flore de Wallonie 2010
Contactez Olivier Roberfroid o.roberfroid@fefem.com