

La Grièche

La feuille de contact de la Cellule Ornithologique
du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse
N°30 – Février 2013

SOMMAIRE

« La Grièche » vidange	p. 1
La Chronique sept. 2012 à nov. 2012	p. 2
Rousserolle des buissons	p. 19
Nains de jardin	p. 21
Une bécasse pour le chat	p. 25
Hibou photogénique	p. 26
Chouette erratique	p. 33
Cigogne en hivernage	p. 36
Méduse	p. 39
Botanique	p. 40



Cercles des Naturalistes
de Belgique asbl



COMITÉ DE RÉDACTION ET DE RELECTURE : JACQUES ADRIAENSEN, SEBASTIEN CARBONNELLE, PHILIPPE DEFLORENNE, THIERRY DEWITTE, FANNY ELLIS, GEORGES HORNEY, MARC LAMBERT, ARNAUD LAUDELOUT, OLIVIER ROBERFROID, SÉBASTIEN PIERRET

« LA GRIÈCHE » VIDANGE

C'est désormais devenu une tradition. Tous les trois ans, l'étang de Virelles subit une vidange complète qui a pour but d'éliminer une partie des poissons devenus trop gros. Cette pisciculture extensive permet de maintenir une bonne qualité de l'eau favorable à différentes espèces prestigieuses de notre avifaune comme le Balbuzard pêcheur, la Grande Aigrette, le Martin-pêcheur d'Europe, la Sterne pierregarin et bien d'autres encore...

C'est aussi un festival pour les naturalistes que nous sommes puisque, outre les poissons, il nous est possible d'observer de très nombreux oiseaux. Cette année encore nous a apporté son lot de surprises et de rencontres...

On se dit « à dans 3 ans » pour la prochaine édition...

Bonnes sorties

Philippe DEFLORENNE

Pour rappel :

L'adresse d'envoi pour les données et les textes est philippedeflorenne@yahoo.fr ou par courrier postal: 53 rue de Martinsart à 6440 Froidchapelle.

Vous pouvez aussi encoder vos données en ligne sur : <http://observations.be/> ou sur <http://lagrieche.observations.be/index.php> (même base de données) et alors plus besoin de les envoyer par un autre procédé.

Pour les photos, prière de les envoyer à Sébastien Carbonnelle à l'adresse suivante (**attention nouvelle adresse!**) : lagrieche.photos@gmail.com. Attention, aucune photo provenant du site « d'Observations.be » ne sera reprise dans « La Grièche ». Si vous souhaitez nous soumettre vos propres photos, merci de nous les envoyer par e-mail.

Si vous ne possédez pas d'ordinateur, vous pouvez recevoir « La Grièche » en format papier. Vous pouvez l'obtenir auprès de Thierry Dewitte à l'adresse suivante : chaussée de Givet, 21 à 5660 Mariembourg.

Vous pouvez également retrouver les différents numéros sur les trois sites suivants :

<http://lagrieche.observations.be/index.php>, www.aquascope.be et :
<http://www.natagora.be/index.php?id=1760>

Merci d'envoyer ou d'encoder vos observations pour les mois de décembre 2012 à février 2013 pour le **15 mars** au plus tard !

LA CHRONIQUE

SEPTEMBRE 2012 – NOVEMBRE 2012

Le coin météo

Vous rappelez-vous encore des conditions atmosphériques que nous avons connues l'automne passé ? Non ? Rien d'étonnant, car cette saison s'est plutôt déroulée sans relief.

Le tableau ci-dessous reprend le bilan climatologique du printemps 2012 pour 4 paramètres (source : IRM – Uccle).

La première partie du tableau (cadre bleu) concerne l'ensemble de la saison. On y relève seulement des valeurs réellement conformes à la norme (« n »). On peut donc conclure objectivement que cette saison a été « tout à fait normale ».

La seconde partie (cadre rouge) donne les mêmes valeurs, cette fois mois par mois.

On y constate un excès de pluviosité considéré comme « très anormal » en octobre compensé par un déficit qualifié de « anormal » en novembre. Par contre, du côté de l'ensoleillement, rien à signaler, si ce n'est un léger excès, dont personne ne se plaindra après un été très incertain et un printemps qui ne restera pas dans les annales !

Paramètre :	Température	Précipitations	Nb de jours de précipitations	Insolation (**)
Unité :	°C	l/m ²	jours	heures:minutes
ETE 2012				
Automne 2012	10,9	215,7	51	345:18
Caractéristiques (*)	n	n	n	n
Normales	10,9	219,9	51	321:60
SEPTEMBRE 2012				
Septembre 2012	14,5	51,6	12	175:22
Caractéristiques (*)	n	n	n	n
Normales	14,9	68,9	16	143:05
OCTOBRE 2012				
octobre 2012	11,1	119,4	21	119:58
Caractéristiques (*)	n	ta	a	n
Normales	11,1	74,5	17	112:38
NOVEMBRE 2012				
novembre 2012	7,1	44,7	18	49:58
Caractéristiques (*)	n	a	n	n
Normales	6,8	76,4	19	66:17

(*) Légende pour les « caractéristiques » du tableau de la page précédente :

Code	Niveaux d'anormalité	Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les ...
n	normal	-
a	anormal	6 ans
ta	très anormal	10 ans

Les événements du mois

Septembre et octobre, la migration est en cours. Les fauvettes et autres insectivores nous quittent les uns après les autres. Viennent ensuite les bandes de granivores parmi lesquels les Pinsons des arbres sont très remarquables cette année. Il en est de même des mouvements de passereaux forestiers ainsi que des inoubliables migrations des ramiers et des grives entre le 18 et le 22/10. Du côté des curiosités on notera une mention particulière d'un mâle hybride de Bergeronnette flavéole x type aux BEH, des Bergeronnettes printanières nordiques, 2 mentions de Bruant ortolan, le Grand Butor à Roly et plus tard, les Marouettes ponctuées à Virelles, les derniers Pipits rousselines ou Pluvier guignard. Avec novembre les oiseaux hivernants arrivent avec quelques raretés classiques aux BEH : Fuligule milouinan, Macreuses noire et brune, Harle huppé... Mais aussi les traditionnels Cygnes chanteurs et de Bewick pour Virelles et/ou les BEH. Parmi les grandes raretés signalons un Cochevis huppé à Clermont, un Pouillot à grands sourcils aux BEH, une Mouette tridactyle à Yves-Gomezée, un Bruant lapon à Niverlée et une Buse pattue à Vierves-sur-Viroin/Matagne-la-Petite et des Jaseurs boréaux à Donstiennes, BEH, Erpion.



BEH : Barrages de l'Eau d'Heure
ESEM : Entre-Sambre-et-Meuse

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : Sur les plans d'eaux régionaux, une petite boule de suif et terre se dérobe inlassablement, plongeant en quête de sa pitance : des petits poissons, adaptés à sa taille, environ la moitié de son cousin le Grèbe huppé. Nicheur en petit nombre dans nos contrées, il est un peu plus abondant à l'automne. Toutes les données de l'espèce nous parviennent de Roly et de Virelles, et bien sûr des BEH où on comptabilise 32 oiseaux le 05/11 et 57 le 18/11 lors de la journée de recensement hivernal des oiseaux d'eau (RHOE).

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : En plus des sites énoncés pour le Grèbe castagneux, on trouve cette année le Grèbe huppé à Yves-Gomezée, site où un couple a, pour la première fois, élevé 5 poussins. Tandis que des migrateurs atterrissent sur nos plans d'eaux, de jeunes oiseaux quémangent encore à leurs parents de la nourriture aux BEH le 10/10. On y comptabilise 162 ex. le 08/11 et 174 le 18.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*) : Le Grèbe à cou noir est le plus rare de nos 3 grèbes nicheurs. En septembre et en octobre, quelques Grèbes à cou noir isolés sont encore aperçus à Falemprise (BEH) et à Virelles.



Grands Cormorans, BEH, le 16/11/12. Photo : Marc Fasol.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : Voilà un oiseau qui ne passe pas inaperçu, plus de 200 mentions ont été rentrées pour cette espèce. L'automne et la migration sont un moment privilégié pour observer ces oiseaux. Un de nous a compté près de 1300 oiseaux en un peu plus d'un mois. C'est toujours un spectacle que de voir une troupe s'assembler dans un majestueux vol migratoire « en V », la harde de chevaliers noirs qui a conquis l'Europe ces 40 dernières années. Les mœurs passionnantes du cormoran peuvent aussi se laisser observer lorsqu'ils s'assemblent dans de grands dortoirs saisonniers : jusqu'à 278 ex. aux BEH le 17/11. C'est là aussi que de temps à autres on peut reconnaître des oiseaux isolément, en lisant une bague : un immature bagué à Mol est présent dès juillet et a été revu le 24/09 et le 02/10, tandis que l'on retrouve avec plaisir deux habitués danois, présents pour leur dixième hiver consécutif, à partir du 04/11.

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) : Le roi du mimétisme est avare de ses observations, un oiseau à Roly le 11/10 ; un autre dans la roselière nord de Virelles le 12/11.

Grande Aigrette (*Casmerodius albus*) : Telle la dame blanche du chevalier noir, la Grande aigrette ne passe pas elle non plus inaperçue (près de 300 mentions) : grande, immaculée, élégante (malgré son cri d'orfraie). Affluant à l'automne en nombres de plus en plus importants de ses quartiers de nidification d'Europe de l'Est, la Grande Aigrette est la plus abondante chez nous en cette saison, même si cette année semble avoir nettement marqué le pas par rapport à 2011. De quelques individus début septembre, on passe à plus de 100 fin octobre, mais seules quelques courageuses affronteront l'hiver chez nous. Ainsi à Virelles, minimum 112 oiseaux sont aperçus le 23/10, alors que l'étang commence à peine à se vider, puis bien que les flaques peu profondes où sont retenues quantités de petits poissons soient une aubaine pour l'espèce, les chiffres régressent à 81 le 29/10, 50 le 30, et 32 le 02/11, et peu d'oiseaux (moins de 10) en journée même à la vidange complète vers la mitant du mois. Les oiseaux de la région s'agglutinent dans des dortoirs pour la nuit, et à Virelles accueille environ 35 oiseaux en novembre. Les effectifs vont encore se réduire avec l'hiver qui s'annonce, mais les grandes aigrettes affrontent de plus en plus tardivement l'hiver chez nous, et quelques-unes restent malgré les rigueurs de notre climat. Ouvrez l'œil.



Grandes Aigrettes, BEH, le 22/10/12. Photo: Marc Fasol.

Héron cendré (*Ardea cinerea*) : Moins nombreux, mais sans doute beaucoup moins noté que sa consœur immaculée. Les populations de héron ont pourtant repris des couleurs depuis leur débâcle dans les années 60. Mais même la vidange de Virelles n'aura pas attiré les foules de hérons : 24 le 29/10, 10 le 02/11, 05 le 17/11.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : le 01 et le 10/09, deux dernières Cigognes noires, bientôt en partance pour l'Afrique de l'Ouest, sont observées à Petigny.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : L'ESEM fut gratifiée cet automne de 13 observations de Cigognes blanches : du 01/09 à Niverlée (11 ex.) au 21/11 à Morville (1 ex.). Un très grand groupe de 80 oiseaux a fait halte pour la nuit à Monceau-Imbrechies avant de reprendre son envol vers le sud le 02/09 à midi. Le surlendemain, un autre groupe respectable (37 ex.) a été observé survolant le Fondry des Chiens à Nismes.

Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) : La Spatule est un oiseau exceptionnellement observé en ESEM. Un jeune individu accompagnait un groupe de 9 Grues cendrées en migration le 26/10 au-dessus de Jamagne.

Cygne de Bewick (*Cygnus colombianus*) : Une seule donnée de 2 ex. à Virelles le 30/11 pour ce petit cygne, dont le passage est annuel depuis au moins 2008 dans notre région. Ils accompagnaient 2 Cygnes chanteurs. On notera sans doute d'autres données dans la prochaine chronique...

Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*) : 2 ex. sont notés dès le 21/11 à Falemprise, puis régulièrement à l'étang de Virelles.

Oie des moissons (*Anser fabalis*) : Une seule donnée « in extremis » le 30/11 à Virelles concerne 1 ex. appartenant à la sous-espèce de la toundra (*Anser fabalis ssp. rossicus*). Elle sera encore observée durant l'hiver (voir notre prochaine chronique).

Oie rieuse (*Anser albifrons*) : Comme pour la précédente, une seule observation d'un adulte à Virelles le 30/11, avec des prolongements hivernaux.

Oie cendrée (*Anser anser*) : Quelques petits groupes le plus souvent de passage, à partir du 19/10. La concentration maximale (12 ex.) est relevée aux abords du lac de l'Eau d'Heure les 08 et 11/11. Parmi elles, on surprend l'un ou l'autre sujet semi-domestique.

Bernache du Canada (*Branta canadensis*) : Cette espèce férale est à présent devenue invasive. Elle se contente de toutes sortes d'étangs, même de petite taille, ce qui explique sa présence aux quatre coins de notre région. On épingle quelques grandes concentrations : 400 oiseaux pâturant à Romérée le 17/09, 171 à Yves-Gomezée le 22/09, 340 à Soumoy le 09/11, 124 à Roly le 19/11...

Bernache nonnette (*Branta leucopsis*) : Beaucoup moins expansive que la précédente, cette petite Bernache a été remarquée, toujours en exemplaire unique, parmi des groupes de cousines du Canada, dans un territoire compris entre Froidchapelle et l'Ouest de Florennes.

Ouette d'Egypte (*Alopochen aegyptiacus*) : Cette espèce venue du Sud est parvenue à se naturaliser chez nous malgré nos derniers hivers plus rigoureux. La plupart des petits groupes jusqu'à 13 individus sont signalés à Jamagne, Virelles, Roly, Yves-Gomezée et les environs des BEH. C'est seulement à Mariembourg que le nombre 20 est atteint le 13/11.

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*) : 1 ex. observé à Jamagne en octobre et à Hanzinne en novembre.

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : 11 individus de ce splendide anatidé sont repérés à Roly le 11/10 et 2 à Virelles le 30/11.

Canard siffleur (*Anas penelope*) : Ce petit canard brouteur plus habitué aux polders a été présent, en petit nombre, sur nos 3 plus importants plans d'eau. Les maxima pour chacun d'entre eux ont été respectivement de 15 pour les BEH, 12 à Virelles et 3 sur Roly.

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) : Cette espèce est soutenue à de nombreux endroits par des apports dans un but cynégétique, si bien que la population réellement sauvage est en déclin probable. C'est en novembre que les plus beaux chiffres sont relevés : 392 aux BEH, 364 à Virelles et 136 à Yves-Gomezée.

Canard pilet (*Anas acuta*) : Le canard à la queue effilée a un faible pour l'étang de Virelles : on en dénombre un maximum de 18 ex. le 29/09, et encore 7 ex. le 17/11.

Canard chipeau (*Anas strepera*) : Comme de coutume, notre joli petit barboteur s'est montré en nombres plus significatifs après la mi-octobre. Les plus gros effectifs seront notés aux BEH avec 63 ex. le 21/11.

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) : C'est à Virelles que l'on compte les groupes les plus fournis : 53 dès le 08/09, 175 le 14/11 et 153 le 17/11. Aux BEH, ils culminent à 61 ex. le 21/11, tandis qu'à Roly, ils plafonnent à 16 ex. le 14/11.

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) : Encore quelques rares données en septembre à Virelles (2 ex. du 01 au 15) et aux BEH (2 puis plus qu'1 ex. le 13).

Canard souchet (*Anas clypeata*) : Cette période convient très bien à cette espèce qui peut compter des groupes d'importance ; jusqu'à 104 ex. à Virelles début novembre, il est vrai que ce filtreur apprécie grandement les mises en assec. Ajoutons aussi 74 ex. le 24/11 à Roly et 24 ex. en octobre et novembre aux BEH.

Nette rousse (*Netta rufina*) : A l'intérieur des terres, ce plongeur recherche avant tout les grands plans d'eau relativement profonds. Des mentions uniquement à Virelles (2 ex. le 08/11) et aux BEH avec 1 ex. les 25 et 26/11.

Fuligule milouin (*Aythya ferina*) : Maximum 50 ex. aux BEH le 25/11, 96 ex. le 20/11 à Roly et 220 ex. le 11/09 à Virelles. Sur ce dernier site, les milouins sont beaucoup moins nombreux en octobre du fait de la baisse importante du niveau d'eau mais on y retrouve 197 ex. le 03/11.

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*) : Les belles concentrations se retrouvent aux BEH où l'espèce apprécie non seulement les grands plans d'eau profonds, mais aussi les populations de moules zébrées ; 28 ex. en septembre, 284 en octobre et jusqu'à 606 ex. en novembre. A Virelles, un beau 98 ex. fin septembre, il est vrai qu'à cette période, l'assec commençait avec peine sur l'étang du fait des fortes pluies.

Fuligule milouinan (*Aythya marila*) : Un mâle de 1^{er} hiver sera admiré sur divers plans d'eau des BEH du 05 au 14/11.

Macreuse noire (*Melanitta nigra*) : Un individu de type femelle aux BEH du 14 au 26/11. Sans doute d'autres données au cœur de l'hiver.

Macreuse brune (*Melanitta fusca*) : Deux femelles de 1^{er} hiver du 15 au 26/11 aux BEH. Là aussi, plus de données dans la prochaine chronique...



Macreuses brunes, BEH, le 15/11/12. Photo : Marc Fasol.

Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*) : Un premier individu observé à Roly dès le 15/10. Maximum régional de 5 ex. aux BEH (novembre).

Harle huppé (*Mergus serrator*) : Un ex. de type femelle, en halte, le 18/11 aux BEH pour cette espèce côtière et donc relativement rare dans nos contrées.

Harle bièvre (*Mergus merganser*) : Les 2 premiers individus de type femelle observés aux BEH le 18 septembre sont relativement hâtifs. Il faudra d'ailleurs attendre novembre pour les suivants avec jusqu'à 3 ex. le 24.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : La dernière bondrée régionale est notée le 21 septembre à Boussu-lez-Walcourt.

Milan noir (*Milvus migrans*) : Quatre dernières données pour ce migrateur hâtif, la dernière le 19/10 où 1 individu est noté en compagnie de 2 « royaux ».

Milan royal (*Milvus milvus*) : Une assez bonne période pour l'observation de ce magnifique rapace dans notre région. Régulièrement observé seul en zone ouverte, on est souvent étonné d'en voir plusieurs (5 ex. le 22/10 à Mariembourg).

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : Des données un peu partout de septembre à octobre. 6 ex. à Niverlée le 01/09, sans savoir si ce sont des isolés en migration ou, ce qui semble moins probable, un rassemblement.

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) : Comme à l'habitude, des données surtout en novembre. Dans tous les cas des isolés essentiellement surpris en zone ouverte.

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) : Des données un peu partout d'individu esseulé. A noter l'ex. houspillé par un épervier le 10/10 à Vergnies.



Autour des palombes, Vaucelles, le 30/10/12. Photo : Serge Motquin.



Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) : Espèce bien répartie dans notre région riche en forêts, bosquets et haies épaisses, novembre se prête à des comptages migratoires d'oiseaux le plus souvent isolés; 17 ex. à Le Mesnil le 10, 4 ex. le 22 à Jamagne, 6 ex. le 24 à Niverlée.

Buse variable (*Buteo buteo*) : Hormis les habituelles buses locales, quelques beaux passages pour qui prend la peine de s'arrêter un peu et d'observer patiemment. Ainsi, les 135 oiseaux dénombrés à Le Mesnil le 10/10.

Buse pattue (*Buteo lagopus*) : Sans doute quelques (rares) pattues ne sont pas mentionnées car confondues avec sa cousine... Néanmoins, 1 donnée d'1 individu observé en migration le 02/11 entre Matagne-la-Petite et Vierves-sur-Viroin.

Epervier d'Europe, Nalines, le 15/09/12.
Photo : Fanny Ellis.

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*) : Septembre est le mois du balbu pour notre région. Malheureusement beaucoup moins observé cette année où il n'y a jamais plus d'un individu à l'étang de Virelles, pourtant le site par excellence à balbusard. 2 fois 1 ex. en migration à Oignies le 28. Le dernier migrateur est vu à le 15/10 à Yves-Gomezée.

Faucon émerillon (*Falco columbarius*) : Ce petit faucon venu du nord est comme à l'habitude observé dès septembre à Jamagne, Mariembourg, Le Mesnil, Sautour,... avec un total de 11 mentions.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) : maximum 4 ex. à Virelles en septembre... Le dernier hobereau régional est vu à Mariembourg le 19 octobre.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : Des locaux, des migrateurs et sans doute l'un ou l'autre candidat à l'hivernage comme l'individu observé à de très nombreuses reprises à Yves-Gomezée.

Perdrix grise (*Perdrix perdrix*) : Souvent des petits groupes familiaux signalés ici et là. Le maximum de 42 ex. le 31/10 à Hemptinne correspond vraisemblablement à des lâchers cynégétiques.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) : Les données automnales sont toujours plus rares que les printanières, les chants s'étant tus. Malgré tout, 2 ex. le 06/09 et 3 ex. le 20/09 dans les plaines de Clermont.

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : Des données en provenance de Virelles, de Roly et plus étrangement de Falemprise où 2 puis 1 ex. sont observés entre le 14 et le 17/11. Le maximum est de 3 ex. le 01/09 à Virelles.

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*) : C'est à Virelles, comme chaque année, qu'est attendue la discrète Marouette ponctuée. Depuis le mirador, la bordure de la roselière ouest est le lieu d'observation idéal. Les plages de vases exondées attirent l'espèce avec encore 3 ex. le 01/09. La dernière observation est réalisée le 20/09. Cet automne, on note également l'observation d'un individu, toujours à l'étang de Virelles, à l'embouchure du Ry Nicolas le 02/09.

Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*) : La « poule d'eau » ne fait jamais les choux gras, en termes d'observations, en ESEM. Maximum 7 ex. à l'étang de Virelles le 08/09 et 10 aux BEH le 15/11.

Foulque macroule (*Fulica atra*) : La foulque, par manque d'herbiers aquatiques, va quitter Virelles assez tôt, on y compte plus que 19 ex. le 29/09. Roly est dans la même situation avec 20 ex. seulement le 15/09. Par contre les BEH vont, comme chaque année, voir leurs effectifs augmenter progressivement. Lors du recensement hivernal des oiseaux d'eau de novembre, 1.202 ex. seront dénombrés...

Grue cendrée (*Grus grus*) : Un premier contingent, annonciateur d'un passage plus soutenu, passe entre le 26 et le 28/10 sur Jamagne et Virelles pour un total de 11 ex. Plusieurs centaines d'individus, au total, vont ensuite survoler les villages de Mariembourg, Treignes, Virelles, Mazée, Boussu-en-Fagne et Salles entre le 14/11 et le 18/11 avec un pic très marqué pour cette dernière date.

Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*) : Une seule mention d'un individu le 04/10 à la Plate Taille (BEH).

Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*) : Après le passage de fin août, une seule mention vient émailler cette chronique : 1 ex. en vol, puis, peut-être posé, le 08/09 à Villers-deux-Eglises.

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*) : 22 mentions en provenance de nos plaines cultivées, pour un total de 108 individus, réparties de septembre à novembre avec une augmentation de la taille des groupes à partir de fin octobre. Les pluviers accompagnent régulièrement des vanneaux mais un ex., au vol, préfère quant à lui la compagnie de cormorans à Sautour le 23/09...

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) : De très nombreuses observations sont rapportées durant toute la période. Un pic migratoire est enregistré à la mi-octobre. Le 21/10, Hugues Dufourny commente son suivi à Jamagne totalisant 3268 ex. pendant la période d'observation : « Suivi de la migration en trois séances totalisant 02h20 de 10h57 à 11h37 (= 00h40), de 11h50 à 12h30 (= 00h40) et de 13h12 à 14h12 (= 01h00). 70 groupes de 6 à 182 ex. Enfin le passage se déclenche vraiment chez le vanneau ! »

Bécasseau variable (*Calidris alpina*) : 4 individus rencontrés durant la période, le premier, un juvénile, le 07/09 aux BEH, ensuite 1 ex. les 16 et 17/09 à Virelles, 1 ex. le 04/10 aux BEH et un dernier les 16 et 17/11 à Virelles, alors en vidange et laissant apparaître de très grandes vasières.

Combattant varié (*Philomachus pugnax*) : Une seule mention d'un individu repéré dans un groupe de vanneaux lors d'un suivi migratoire le 15/10 à Yves-Gomezée.

Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*) : 3 mentions : 1 ex. dans la vallée de l'Eau Blanche le 02/11, 2 ex. dans la vallée de l'Hermeton le 14/11 et 3 ex. en compagnie d'une trentaine de Bécassines des marais le 21/11 à Virelles, à l'emplacement de la roselière étrepée (dont on a enlevé la couche superficielle de manière à la régénérer)...

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : Signalée à Virelles, Fagnolle, Hemptinne, Senzeille, Tarcienne, Yves-Gomezée et dans la vallée de l'Hermeton. Comme chaque année, la plus forte concentration est renseignée à Virelles avec au minimum 72 ex. le 19/11.

Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) : Fin octobre – début novembre, de nombreuses mentions vont émailler cette chronique. Des mouvements sont sans doute perceptibles avec, au maximum, 5 ex. le 02/11 à Macquenoise. Ensuite, les données rentrent dans la normale avec l'observation, ici et là, d'individus isolés.

Courlis cendré (*Numenius arquata*) : En septembre, un premier ex. est signalé le 10 à Hemptinne, ensuite 2 ex. vont passer l'après-midi du 16 à Virelles. Un dernier y sera encore contacté le lendemain.

Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : Un seul individu en halte, les 02 et 03/09 à Virelles.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : Seul l'étang de Virelles va nous livrer des mentions, qui plus est régulières, de ce grand chevalier entre le 01 et le 28/09, avec un maximum de 3 ex. les 09 et 12.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*) : Mis à part les mentions d'un ex. les 02 et 19/09 à Mariembourg et d'un individu à Donstiennes le 12/10, de très nombreuses observations émanent de Virelles où l'espèce est renseignée jusqu'à la fin du mois de novembre, attirée par les grandes vasières générées par la vidange de l'étang. Début septembre, des nombres de 6 à 7 ex. y étaient régulièrement renseignés.

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : Un ex. est noté à de nombreuses reprises entre le 08 et le 24/09 à l'étang de Virelles. Il accompagnait souvent les Chevaliers culblancs.

Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*) : Signalé en de nombreux endroits mais jamais en grands nombres, au maximum 7 ex. le 03/09 à Virelles. Le dernier ex. est renseigné aux BEH le 19/10.

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) : Un adulte en plumage nuptial, parmi des Mouettes rieuses, le 19/11 à Jamagne est la seule mention de cette chronique.

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : Parmi les nombreuses observations de Mouettes rieuses, nous retiendrons celle, peu classique, du 14/11 aux BEH d'un individu bagué en Pologne (blanc TH35). Cet individu y avait déjà été observé l'hiver passé. Pour l'anecdote, c'est la première fois qu'une bague de Mouette rieuse est relue dans l'ESEM.

Goéland cendré (*Larus canus*) : 3 mentions en septembre, 3 en octobre et 23 en novembre. Ceci nous éclaire bien sur la phénologie du Goéland cendré, espèce à tempérament hivernal dans nos régions. A partir de novembre les nombres augmentent et culminent lors des grands froids.

Goéland brun (*Larus fuscus*) : L'automne est la meilleure période pour l'observation du Goéland brun dans la région. Les individus migrent alors vers le sud-ouest de l'Europe, traversant notre région. Les jeunes individus vont nous quitter les premiers, laissant ensuite la place aux adultes. Le phénomène est repéré par Jean-Yves Paquet qui renseigne moins de 5% d'immatures parmi 800 oiseaux le 02/11 à Virelles. On note également l'observation le 24/11, aux BEH, de 2 vieilles connaissances : noir R7LF, un goéland anglais,

relevant donc de la sous-espèce *graellsii* connu depuis 2006 dans la région et de bleu KA bagué en Belgique mais sans doute d'origine hollandaise, un « *Dutch intergrade* » donc, connu depuis 2007.

Goéland argenté (*Larus argentatus*) : D'abord discret, les Goélands argentés vont s'implanter réellement à partir de novembre. A cette époque, la sous-espèce *argenteus* côtoie *argentatus*, un ex. à pattes jaunes ("*omissus*") est signalé le 15/11 aux BEH. Un individu 1^{er} hiver bagué en Belgique bleu YTAG est identifié le 19/11.

Goéland leucophée (*Larus michahellis*) : Durant septembre et octobre, le Goéland leucophée est sans doute le Goéland de type argenté le plus commun dans la région. En novembre, l'arrivée des G. argentés et pontiques le rend plus discret bien que toujours très présent. L'individu bagué jaune H2J8, né en Allemagne, est revu pour le second hiver consécutif sur les pontons de Falemprise.

Goéland pontique (*Larus cachinnans*) : A une date très classique, le 02/11, les 5 premiers individus de l'hiver sont observés à Virelles. On les retrouve ensuite mélangés avec d'autres espèces de goélands notamment leucophées surtout aux BEH.

Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) : Une seule observation, toujours exceptionnelle, d'un individu de 1^{er} hiver le 01/11 à Yves-Gomezée.



Pigeon colombin (*Columba oenas*) : Généralement peu détecté dans la région, Hugues Dufourny l'a particulièrement bien suivi cette année. Un pic d'observation est détecté la seconde quinzaine d'octobre. Le maximum atteint 275 ex. le 19/10 avec un suivi de la migration de 09h10 à 13h25 (= 04h15) incluant 59 passages de 1 à 29 ex. parmi les Ramiers.

Pigeon ramier (*Columba palumbus*) : Signalé durant toute la période mais c'est surtout fin octobre que le passage se fait sentir avec par exemple 3.800 ex. le 24/10 à Vaucelles (en 3h de suivi), 1.500 ex. le 25/10 à Hemptinne (un seul groupe) et 2.500 ex. le 31.10 à Fraire (un seul groupe).

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : Le plus grand groupe renseigné : 83 ex. le 26/09 à Villers-deux-Eglises incluant une Tourterelle des bois.

Tourterelle turque et sa tique, Nalinnes, le 18/09/12.
Photo : Fanny Ellis.

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : A peu près chaque année, le mois de septembre est l'occasion d'observer une ou l'autre dernière Tourterelle des bois. Cette fois, 2 ex. sont surpris le 04/09 à Hemptinne et une toute dernière le 26/09 à Villers-deux-Eglises, en compagnie de Tourterelles turques.

Effraie des clochers (*Tyto alba*) : Seules deux données concernant la dame blanche nous sont parvenues, toutes de début septembre. La première est la triste découverte de deux jeunes trouvés morts au pied du nichoir à Roly, de faim semble-t-il, suite à la disparition d'un des adultes? La seconde est l'envol d'un exemplaire d'un buisson au passage de l'observateur à Saint-Aubin. Étonnant qu'un individu adulte se soit laissé surprendre en plein jour en dehors d'un bâtiment, il s'agit plus probablement d'un immature en recherche d'un territoire où s'installer et qui aura décidé d'y faire une pause au hasard de ses pérégrinations.

Chouette chevêche (*Athene noctua*) : Elle nous est renseignée dans 13 localités bien réparties dans toute la région à l'exception de la partie ardennaise. La plupart des données proviennent de la localité où habite l'observateur, il n'y a donc pas eu de recherches ciblées. En novembre, on peut remarquer un regain d'activités avec des cris et des chants émis dans de nouveaux sites ou de sites plus habituels mais non occupés ce printemps, à la recherche d'un territoire où s'établir.

Chouette hulotte (*Strix aluco*) : Cinq données du chat-huant, trois en septembre dont un chanteur le 21 à Boussu-lez-Walcourt, une en octobre et la dernière en novembre.

Hibou grand-duc (*Bubo bubo*) : Cinq données mais qui se limitent à deux sites carriers à l'exception d'un exemplaire trouvé mort, au sol, à Dailly le 21/09, probablement victime de la circulation.

Hibou moyen-duc (*Asio otus*) : Une seule donnée, 3 ex. le 17/10 à Roly.

Martinet noir (*Apus apus*) : Une seule donnée tardive, un oiseau est vu en soirée le 04 septembre à Rance.

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) : L'étang de Virelles enregistre beaucoup d'observations, suivi ensuite par le complexe des BEH. Ailleurs, il est signalé à Seloignes, Chimay, Mariembourg, La Buisnière (confluence de la Hante et de la Sambre), Soulme, Vodelée, Yves-Gomezée, Hemptinne, Olloy-sur-Viroin, Thy-le-Bauduin, Roly, Fagnolle et Cerfontaine. Ce qui laisse supposer sa présence sur les cours d'eau suivants : l'Eau Blanche, la Hante, l'Hermeton, le ry d'Yves, l'Eau d'Heure, la Brouffe et le Viroin. À Petite-Chapelle, deux individus passent la mauvaise saison sur un complexe d'étangs jusqu'à ce qu'ils soient pris par les glaces, l'espèce déserte alors le site.



Martin-pêcheur d'Europe, BEH, le 23/10/12. Photo : Marc Fasol.

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : Si c'est en août que l'on a le plus de chance de surprendre le torcol lors de son voyage vers le sud, il est encore possible de l'observer en septembre, 1 ex. le 09 à Roly et 1 ex. le 10 à Hemptinne.

Pic noir (*Dryocopus martius*) : Peu abondant que le précédent, est vu à Petigny, Virelles, Soumoy, Hemptinne, Olloy, Presgaux, Mariembourg, Oignies, Treignes et Matagne-la-Grande.

Pic épeiche (*Dendrocopos major*) : Toujours bien présent dès qu'il a des arbres.

Pic mar (*Dendrocopos medius*) : Une vingtaine de données, pas mal du tout. À part un exemplaire se cognant à une baie vitrée le 02/09 à Surice et quelques individus dans les jardins (mangeoires, pommes,...), la plupart vu ou entendu l'est dans les forêts de la Fagne et dans le nord de la région.

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*) : Cinq données dont quatre en septembre, un mois où il est particulièrement en voix.

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : Cette espèce a niché historiquement dans l'ESEM mais est toujours restée très rare en Wallonie aussi bien comme nicheur qu'en observation. Une régression marquée s'est accentuée ces 50 dernières années. Une petite population se maintient encore à la côte belge mais l'on est en droit de se poser la question de savoir jusqu'à quand... A l'intérieur des terres, elle est devenue aujourd'hui exceptionnelle. C'est pourquoi la première donnée pour la zone agricole des environs de Clermont-lez-Walcourt, le 30/09, d'un ex. en migration mérite toute notre attention.

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : Près de 35 données, pas mal du tout, provenant des « migratologues » qui consacrent du temps à observer le passage pendant plusieurs heures d'un point fixe, tout en notant les espèces et le nombre d'oiseaux par espèce. Si la première observation date du 22/09 à Villers-deux-Eglises, c'est principalement du 11/10 au 24/10 que le passage a eu lieu cette année (jusque 200 ex. comptabilisés le 18 sur Clermont et Jamagne), dernière donnée, le 01/11 à Hanzinne.

Alouette des champs (*Alauda arvensis*) : Si la migration est déjà perceptible fin septembre, le plus gros du passage a lieu entre le 15/10 et le 31/10 cette année, avec comme plus gros scores 4000 oiseaux le 20/10 à Tarcienne et près de 3000 la matinée du 22/10 à Jamagne. Le passage touche à sa fin début novembre, quelques groupes traînent ensuite, les premiers candidats à l'hivernage ?

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : Si 17 ex. de petites hirondelles brunes sont encore dénombrés le 13/09 à Falemprise, seuls quelques rares individus sont observés courant septembre, maximum trois ex., toujours aux BEH. Le dernier ex. est vu à Niverlée le 03/10.

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : Si quelques groupes de maximum 100 individus sont encore renseignés début septembre dans certains villages, ce sont des oiseaux en passage actif dénombrés surtout dès la mi-septembre ou rassemblés sur les principaux plans d'eau régionaux qui sont transmis avec comme gros score près de 300 ex. à Yves-Gomezée le 01/10. On a déjà connu des chiffres plus importants. La dernière hirondelle est observée le 01/11 à Petigny.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) : Si quelques dizaines d'individus sont renseignés la première décade de septembre, cette hirondelle nous a vite quittés, stationnant encore un peu sur les plans d'eau ou vue rapidement de passage, les dernières sont les 3 ex. du 17/10 à Yves-Gomezée.

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : Deux dernières données après celles d'août, 1 ex. le 01/09 à Niverlée et 2 ex. juvéniles le 21/09 à Hemptinne.

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) : Passage très discret de septembre à mi-octobre, record de 11 ex. le 28/09 à Senzeille, dernier vu le 16/10 à la Plate Taille.

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) : Passage remarqué mais sans éclat, chiffres maxima : 135 ex. le 30/09 à Clermont, 220 ex. le 14/10 à Senzeille, 157 ex. le 15/10 à Yves-Gomezée, 310 ex. le 18/10 à Clermont, 90 le 20/10 à Saint-Aubin, 80 le 21/10 à Roly, 24 ex. le 13/11 à Senzeille... dernier noté le 25/11 à Vergnies.

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) : Les montagnards sont là, le premier individu est découvert à Hemptinne le 08/10, discret encore à Senzeille, Dourbes, Yves-Gomezée, Brûly-de-Couvin, un sursaut à Roly avec 10 ex. le 21/10, à nouveau discret dans les vallées de l'Eau Blanche et de l'Hermeton et, avec 3 ex. à Merlemont le 28/11.

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava flava*) : Belle présence du 09 au 23/09, surtout la seconde décade de septembre avec au maximum une trentaine d'ex. Si non, observée chaque jour, dernier ex. le 15/10 à Soumoy.

Bergeronnette flavéole (*Motacilla flava flavissima*) : Un mâle adulte hybride avec *flava*, le 07/09 sur la plaine de jeux de Falemprise. L'oiseau ressemblait à une flavéole, dont la tête était vert-olive mais sourcil très blanc sauf l'arrière jaune et peut-être légèrement à l'avant.

Bergeronnette printanière nordique (*Motacilla flava thunbergi*) : 5 ex. en compagnie d'une trentaine de *flava* le 18/09 à Jamagne.

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) : De 1 à 4 individus, vus de ci de là, aux abords des principaux plans d'eau régionaux et des cours d'eau. L'un ou l'autre oiseau est dénombré lors du suivi du passage migratoire.

Bergeronnette grise (*Motacilla alba alba*) : Le premier groupe est noté le 16/09 à Virelles, 23 ex., la migration est en route. Premier beau passage détecté le 23/09 en soirée à Jamagne avec 64 ex., ensuite cela continue avec un pic le 09/10 dont 234 ex. à Sautour en une matinée, pour diminuer à partir du 20/10 avec 89

ex. à Senzeille et 71 à Tarcienne. Ensuite, l'espèce est toujours présente, en petits groupes, de 1 à 7 ex. jusqu'à la fin novembre sur l'étang de Virelles et les BEH.



Bergeronnette grise, Bioul, le 06/10/12. Photo: Olivier Colinet.

Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*) : Présent quelques jours à la mi-novembre, 1 ex. le 14 à Erpion, 5 ex. à Donstiennes le 15, 12 ex. le 15 et 13 le 16 aux BEH, enfin 1 ex. à Cerfontaine le 25/11, soit un tir groupé autour des BEH.

Cincla plongeur (*Cinclus cinclus*) : Une douzaine de données en des endroits habituels, hormis un individu volant haut en paysage agricole à Yves-Gomezée (migration active ?) le 22/10. Un individu chanteur est entendu sur le Viroin à Olloy le 08/11.

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*) : Un dernier exemplaire à l'étang de Virelles le 01/09 tandis qu'un migrateur très attardé est encore vu le 22/09 à Villers-deux-Églises.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : Présent chaque jour en petits nombres, si quelques chanteurs sont encore entendus en septembre et durant les premiers jours d'octobre, ce sont majoritairement des oiseaux de passage qui sont notés. Pas de pic de passage constaté, les derniers individus sont notés le 21/11 à Le Mesnil.

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) : Bien noté en septembre, en exemplaire isolé excepté ces 3 ex. le 05 qui sont vus à Villers-deux-Églises et ces 2 ex. à Pesche le 21. Cinq données concernent octobre, la dernière étant du 20 à Saint-Aubin.



Tartier des prés (*Saxicola rubetra*) : Le passage continue en septembre avec un maximum de 25 ex. le 01 à Jamagne. Des groupes de 1 à 11 ex. s'observent un peu partout dans la région jusqu'à la fin du mois. 6 données en octobre avec deux derniers ex. le 10 à Le Mesnil.

Tartier pâtre (*Saxicola torquata*) : Il n'est pas toujours facile de discerner les nicheurs locaux, encore présents sur les sites de reproduction, des migrateurs. On note un maximum de 10 ex. le 19/09 à Hemptinne. Un retardataire est surpris le 25/11 à Boussu-lez-Walcourt.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : Des troupes lâches de 1 à 5 migrateurs sont épinglés jusqu'en début octobre. La plupart des mentions viennent des plateaux agricoles du nord de la région. Un dernier ex. est observé le 22/10 à Presgaux.

Traquet motteux, 15/10/12. Photo: Georges Horney.

Merle à plastron (*Turdus torquatus*) : Deux observations d'isolés alimentent cette chronique : 1 ex. du 11 au 13/10 à Senzeille et 1 ex. le 23/10 à Cul-des-Sarts.

Grive litorne (*Turdus pilaris*) : Une donnée de 33 ex. le 21/09 à Hemptinne concerne sans doute la population locale. Le passage n'a pas vraiment démarré en octobre avec tout au plus quelques éclaireurs le 15/10. Le passage prend de l'ampleur en novembre avec 142 ex. le 01 et 750 ex. à Jamagne le 02. On note toujours à Jamagne, 310 ex. le 03 et 400 ex. le lendemain à Villers-deux-Eglises. L'espèce redevient moins nombreuse après les beaux chiffres du début du mois. Après la première décade un faible maximum de 39 ex. le 26 à Soumoy.

Grive musicienne (*Turdus philomelos*) : Les premiers mouvements migratoires sont signalés en fin septembre ici et là. Le passage s'intensifie durant la deuxième décade d'octobre : 21 ex. le 10 à Le Mesnil, 40 ex. le 11 à Senzeille, 193 ex. le 12 à Donstienne, 59 ex. le 13 à Senzeille, 32 ex. le 14 au même endroit, 40 ex. le 15 à Romérée. La migration s'atténue à la fin du mois. En novembre aucune donnée ne dépasse la dizaine d'ex.

Grive mauvis (*Turdus iliacus*) : Un premier migrateur apparaît dans la région le 06/10 à Yvs-Gomezée suivi de quelques ex. durant la première décade : 1 ex. le 08 à Jamagne, 2 ex. le même jour à Hemptinne et 4 ex. le 09 à Tarcienne. Les bandes sont plus imposantes durant la deuxième décade. On peut retenir 270 ex. comptés en 3 heures le 11 à Senzeille, 84 ex. le 12 à Saint-Aubin, 228 ex. en 02h30' le 13 à Senzeille. Pour la suite le passage d'octobre reste régulier mais on n'enregistre plus de rassemblements importants : 54 ex. le 19 à Mariembourg, 45 ex. sur 01h30' le 20 à Senzeille. Les troupes les plus fournies en novembre sont 87ex. le 03 à Jamagne, 70 ex. le 04 à Philippeville, 100 ex. le 06 à Olloy-sur-Viroin, 61 ex. le 08 à Erpion, 83 ex. le 13 à Senzeille et un maximum de 30 ex. le 23 à Cerfontaine pour la troisième décade.

Grive draine (*Turdus viscivorus*) : Des mouvements migratoires s'observent de septembre à novembre. On commence par des concentrations en septembre : 15 ex. et 13 ex. le 08 à Villers-deux-Eglises sans oublier 15 ex. le 23 à Olloy-sur-Viroin remisés dans un champ de légumineuses. Le passage se remarque surtout en octobre. On peut citer parmi les meilleurs chiffres 18 ex. le 10 à Le Mesnil, 20 ex. le 11 en 3 heures à Senzeille, 14 ex. le 15 à Yves-Gomezée, 12 ex. le 16 et le 18 dans la même localité, 23 ex. le 19 à Senzeille et de nouveau 15 ex. le même jour à Yves-Gomezée. On clôture le mois avec 17 ex. le 27 à Fagnolle. Les observations sont moins nombreuses en novembre. On note un maximum de 5 ex. le 02 à Vervies-sur-Viroin.



Grive draine, BEH, le 22/10/12. Photo : Marc Fasol.

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) : Peu de données concernent la migration post-nuptiale de ce passereau aux mœurs cachées. On peut signaler 1 ex. le 14/09 à Saint-Aubin, 1 ex. le 17/09 à Vodecée et 1 ex. le 27/09 à Jamagne. Un individu est encore vu le 21/10 à Hemptinne. Il s'agit de la donnée la plus tardive pour toute la région.

Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) : Le passage est difficilement détectable en dehors du baguage. Ce sylvidé aquatique n'est observé qu'une seule fois avec 1 ex. le 15/09 à Virelles.

Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*) : Elle quitte nos roselières en août et en septembre mais un couple nourrit encore à Virelles durant la première décade de septembre, on signale un faible maximum de 3 ex. sur le même site le 15. Des migrateurs sont observés loin des phragmites: 1 ex. le 04 à Hemptinne, 1 ex. le 05 à Villers-deux-Eglises et un dernier est surpris le 30 dans un champ de maïs à Jamagne.

Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*) : Huit mentions en septembre témoignent de la fin du passage: 1 ex. le 03 et le 05 à Mariembourg, 1 ex. le 05 à Roly, 2 ex. le 07 à Saint-Aubin, 1 ex. le 08 à Villers-deux-Eglises, 1 ex. le 10 et 1 ex. le 14 à Hemptinne.

Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : Le passage de cette fauvette bocagère se prolonge en septembre. On peut retenir 17 observations avec un dernier ex. le 27/09 à Jamagne.

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) : Mentionnée seulement à deux reprises durant le mois de septembre: 1 ex. le 07 à Saint-Aubin et 1 ex. le 10 à Hemptinne.

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : La migration est surtout intense en septembre, 32 ex. sont rapportés durant ce mois avec 10 ex. le 15 à Virelles ce qui correspond au pic de passage. 4 données alimentent la chronique en octobre. 3 observations sont encore effectuées en novembre avec 1 ex. le 14 à Falemprise (BEH), 1 ex. le 15 à Vergnies et un dernier ex. le 16 à la Plate Taille (BEH).

Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*) : Le plus fréquent des pouillots accidentels sibériens est observé pour la troisième fois dans la région. Hugues Dufourny découvre un ex. le 04/10 à la Plate Taille (BEH).

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) : Le passage est régulier de septembre à fin d'octobre. Les meilleurs chiffres viennent de Virelles avec 20 ex. le 15/09, 11 ex. le 16 et 10 ex. le 06/10 sur 1 km de rive. Après cette date, aucune donnée ne dépasse la dizaine d'ex. En novembre 1 ex. le 14 à Vergnies, 1 ex. le 17 à Falemprise (BEH), 1 ex. le 19 à Roly et un dernier ex. le 24 au lac de l'Eau d'Heure (BEH).

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : 4 observations d'isolés sont réalisées en septembre excepté 2 ex. le 16 à Pesche. Fin du passage en octobre avec 1 ex. le 04 à Boussu-lez-Walcourt.

Roitelet huppé (*Regulus regulus*) : L'espèce est notée régulièrement tout au long de l'automne sans véritable relief. On signale un maximum de 9 ex. le 31/10 à la Plate Taille (BEH).



*Pouillot véloce, Nalines, le 18/09/12.
Photo : Fanny Ellis.*

Roitelet triple-bandeau (*Regulus ignicapillus*) : Le passage de ce minuscule passereau est peu renseigné. 5 données en septembre : 1 ex. le 06 à Yves-Gomezée, 1 ex. le 07 à Saint-Aubin, 3 ex. le 10 à Hemptinne, 1 ex. le 15 à Virelles et 1 ex. le 16 à Villers-deux-Eglises. En octobre, on signale 1 ex. le 10 et 1 ex. le 14 à Mariembourg, 1 ex. le 21 à Hemptinne et un dernier sujet le 24 à la Plate Taille (BEH). L'espèce est rare durant la mauvaise saison et on sait peu de choses sur un éventuel hivernage dans la région.

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : La migration post-nuptiale se poursuit en septembre. Il est observé sur une dizaine de sites totalisant 14 ex. Un dernier ex. est enregistré le 29 à Mariembourg.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : Mentionné à 4 reprises en septembre : 1 ex. le 02 à Froidchapelle, 2 ex. le 04 à Mariembourg, 1 ex. le 06 à Nismes et 1 ex. le 16 à Soumoy.

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) : Des individus à tête blanche sont observés ici et là. Il ne s'agit pas toujours d'oiseaux de la sous-espèce nominale mais parfois d'une variété de plumage développé par des sujets locaux. Rappelons que la sous-espèce *caudatus* (nord de l'Europe) est soumise à la commission d'homologation. Au cours de cet automne, la **Mésange à longue queue** est renseignée à 32 reprises avec un maximum de 22 ex. le 11/10 à Senzeille.

*Mésange à longue queue, Gonrieux, le 30/10/12.
Photo : Georges Horney.*



*Cache-cache avec la Sittelle torchepot,
Nalimmes, le 18/09/2012.
Photo : Fanny Ellis.*

Passereaux forestiers : L'automne 2012 a été marqué par des déplacements massifs de nombreux passereaux forestiers. Début septembre, la **Mésange noire** (*Parus ater*) et la **Sittelle torchepot** (*Sitta europaea*) sont remarquées : tant des oiseaux isolés que des petits groupes apparaissent en des endroits dont elles sont habituellement absentes. Au même moment, des abondances inhabituelles sont remarquées sur les quelques points de nourrissage déjà actifs... En novembre, la situation semblait toutefois se normaliser pour ces deux espèces. Les données du **Grimpereau des jardins** (*Certhya brachydactyla*) étaient également bien plus nombreuses qu'à l'habitude en septembre, bien que personne ne semble l'avoir remarqué. Les observations de l'espèce redevenaient rapidement plus rares dès la fin septembre. Le **Geai des chênes**

(*Garrulus glandarius*) participait au même mouvement : 648 oiseaux et une abondance exceptionnelle renseignés en septembre, 78 en octobre et 28 en novembre...

Le passage de la **Mésange huppée** (*Parus cristatus*) a lui aussi été remarqué, en particulier en octobre-novembre, mais l'espèce ne semblait guère plus abondante qu'à l'habitude. C'est à partir de la mi-octobre que les observations de la **Mésange bleue** (*Parus caeruleus*) se sont multipliées. L'invasion a clairement été mise en évidence par le suivi migratoire, grâce à l'apparition de petits groupes de mésanges dans les milieux où cette espèce est d'ordinaire peu fréquente. 327 ex. en 35 groupes ont ainsi été observés à Clermont le 18/10. Cet afflux fait visiblement partie d'un mouvement qui a débuté dès la fin septembre dans le Nord de l'Europe, notamment à Falsterbo, avec plus de 21.000 oiseaux comptés le 30/09. Une vidéo de cette migration exceptionnelle est visible ici : <http://www.youtube.com/watch?v=XZb5GBWo74Q>

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : 14 observations en ce mois de septembre, soit un peu plus qu'un mois de septembre classique. Les deux derniers oiseaux sont observés le 22/09 à Villers-deux-Eglises.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : Toujours plus rare, l'espèce a été très discrète cet automne alors que l'hiver 2011-2012 était plus encourageant. On peut penser que sa rareté est liée celle des micro-mammifères dont elle se nourrit. L'espèce est renseignée à Gimnée, Brûly-de-Pesche, Brûly-de-Couvin, Roly et Romérée.

Pie bavarde (*Pica pica*) : On retiendra, pour l'anecdote, 6 oiseaux posés sur le dos d'une même vache le 30/09 à Florennes.

Grand Corbeau (*Corvus corax*) : Six observations autour d'Oignies et Le Mesnil, une à Roly, à Brûly, à la Montagne-aux-Buis et à Hemptinne. Il s'agit de la première observation au nord de Philippeville, mais qui concerne probablement un oiseau erratique.

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : Début de la migration en octobre, culminant vers le 24 de ce même mois. On retiendra une observation insolite d'oiseaux qui chassent les insectes aériens tout en migrant à Tarcienne le 21/10.

Moineau domestique (*Passer domesticus*) : On retiendra un max. de 94 oiseaux le 06/09 à Jamiolle.

Moineau friquet (*Passer montanus*) : Au plus 76 ex. le 10/09 à Hemptinne.

Astrild ondulé : Une nouvelle espèce pour la région ! L'Astrild ondulé est un petit passereau africain souvent maintenu en cage... Un oiseau reste quelques minutes dans un champ de maïs le 21/10 à Jamagne puis s'élève et part vers le NW.

Geai des chênes, Nalinnes, le 18/09/12. Photo : Fanny Ellis.



Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : Passage important en octobre avec au plus 6.018 oiseaux comptés le 18 à Clermont.

Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*) : Les premiers oiseaux sont notés le 30/09 à Clermont et Hemptinne, ensuite le 01/10 à Mariembourg. Aucune donnée ne dépasse les 100 individus pour cette période.

Serin cini (*Serinus serinus*) : 5 observations pour la période considérée dont la dernière le 15/10 à Jamagne.

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*) : Très discret en septembre (4 observations), le Tarin est régulièrement contacté à partir d'octobre. De petits groupes se joignent au flux des migrateurs et quelques stationnements sont observés.

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) : Présent pendant toute la période considérée, avec au maximum 300 ex. entre le 19/09 et le 19/10 à Hemptinne.



Verdier d'Europe, BEH, le 15/11/12. Photo : Marc Fasol.

Sizerin flammé (*Carduelis flammea*) : 33 mentions sur la période nous incitent à penser à un petit afflux de l'espèce à partir du 07/10 mais surtout à début novembre. La majorité des observations ne donnent pas de précision quant à la sous-espèce. Seules 6 font référence au Sizerin cabaret, ce qui laisse supposer que la majorité des observations relèvent de cette sous-espèce originaire d'Europe centrale ou d'Angleterre, alors que la ssp *flammea*, originaire de Scandinavie, semble absente. Pas de grosses troupes cependant, tout au plus 6 ex. le 30/10 à Roly.

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*) : Durant toute la période, observés seuls ou en petites bandes, lors de suivi migratoire ou en halte. Maximum 14 ex. le 24/10 à Niverlée.

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) : Les mouvements sont particulièrement remarquables en octobre lors de suivis migratoires. Avec, par exemple, un beau passage le 06/10 à Yves-Gomezée avec 24 ex. sur 01h30 d'observation.

Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*) : En vol parmi une douzaine d'Alouettes des champs le 17/10 à Niverlée.

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) : Présent durant toute la période avec parfois de belles concentrations comme 34 ex. le 21/09 à Saint-Aubin ou 30 ex. le 29/11 à Fagnolle. Le 08/11, un chanteur est entendu distinctement à Pesche.

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) : Espèce peu courante par excellence, 2 mentions honorent toutefois cette chronique : 1 mâle posé dans un arbre, puis dans champ, le 03/09 près de la Plate Taille et 1 ex. entendu au vol le lendemain à Hemptinne.

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) : 59 mentions rapportées d'oiseaux en halte ou en migration. A titre d'exemple, on retiendra un maximum de 74 ex. repérés en 04h15 de suivi pour 51 passages de 1 à 6 ex. le 19/10 à Senzeille.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont transmis leurs observations par un canal ou un autre. Sans elles, cette rubrique n'aurait jamais vu le jour...



Impression – PNVH



**QUEL EST DONC
CET OISEAU ?**

Solution page 39



AVIFAUNE

Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumetorum*)

Texte et photos de Marc Fasol

Observation à Cost ar Reun (île de Ouessant - Finistère - France), le 15 octobre 2012 :

Une espèce bien discrète qui passe très certainement inaperçue partout où elle se rencontre en migration post-nuptiale...

Quelques caractères importants à noter :

- Le bec: mandibule inférieure à pointe sombre diffuse;
- Les tertiaires: unies (critère qui élimine l'isabelle);
- Les flancs: couleur chamois-olive (et non pâle);
- Les projections: courtes (critère qui élimine l'effarvatte et le verderolle);
- Les pattes: gris-brun (et pas jaunes ou rose comme pour l'effarvatte et la verderolle).





Quand les nains descendent au jardin

Texte et photos de Marc Fasol

Des cris fins, susurrés, à peine audibles, percent le silence de la forêt endolorie. Bêret doré vissé sur le sommet du crâne, les roitelets huppés sont de sortie. En ce mois d'octobre, les rafales ont détrempe ce qui reste de feuillage et pour les petits rois de la forêt, la quête de nourriture se fait de plus en plus fastidieuse. Leur ration journalière en est réduite à la portion congrue: des œufs, des larves d'insectes tout au plus, constituent le plat de résistance. Au hasard de leurs prospections, les petites bandes passent d'arbre en arbre, de branche en branche, pour fréquenter d'autres essences que les conifères où ils sont restés cantonnés tout l'été.

Toujours en mouvement, les nains débarquent maintenant au jardin. Chaque buisson, chaque branche, chaque brindille, même dégarnie, est explorée avec minutie dans ses moindres recoins. Paul Géroutet dira d'eux: "A tout instant, l'un d'eux papillonne sur place devant l'extrémité d'une ramille pour y cueillir une bestiole; à l'occasion, il se suspendra sous un rameau, à l'instar d'une mésange, mais c'est rare: les roitelets ne sont pas des acrobates".

Armé de mon appareil photo pour en témoigner, j'ai pu figer différentes postures et apporter un bémol à cette dernière affirmation. Appartenir à la catégorie poids plumes présente apparemment quelques avantages bien utiles en période de disette. Il n'est pas donné à n'importe quel passereau de s'accrocher à une feuille sans la faire fléchir afin d'y cueillir tout en souplesse des œufs de pucerons.









Une bécasse pour le chat

Par Thierry Dewitte

« Nom d'un chat, nom d'un chat, n'est-ce pas une bécasse que je vois là ? » Cette phrase m'est inspirée par un lointain souvenir du dessin animé Titi et gros Minet vu en noir et blanc à l'époque, chez ma grand-mère, au moment où je raccroche le combiné téléphonique.

On est le samedi 08/12, il est près de 22 heures, vers la fin du film « La tête en friche » pour ne pas le citer, quand Françoise Ryelandt m'appelle pour m'informer qu'une bécasse vient d'être rapportée par le chat au domicile de sa fille à Ottignies. Nous sommes tous les deux étonnés car la bécasse est un oiseau assez gros et montre une telle vigueur à l'envol... Comme quand on a failli mettre son pied dessus lors d'une promenade forestière... On imagine mal un tel volatile se laisser traîner sans résistance par un minou. Mais il paraît que le chat ornithophage est « un costaud », enfin, ornithophage est vite dit car la bécasse ne semble pas avoir perdu beaucoup de plumes dans l'aventure et est bien vivante.

La confirmation de l'espèce nous arrive bientôt par le biais d'une photo numérique via internet (voir cliché joint à cette note). Pas de doute, c'est une bécasse. J'avais déjà surpris l'espèce en cette fin d'automne au cœur de l'agglomération de Nivelles-Baulers, posée au sol dans de petits espaces sauvages du type bosquet d'arbustes au sol couvert de ronces, ou petite peupleraie aux hautes herbes. Je l'informe que l'oiseau devait être dans la même situation et connaissant son habitude d'attendre le dernier instant pour s'envoler face à un danger, elle a dû se laisser surprendre. Comme elle migre surtout de nuit, il est possible qu'elle ne choisisse pas toujours le meilleur endroit pour se poser. De plus, le temps neigeux de la veille a peut-être provoqué un déplacement assez marqué des bécasses vers le sud ou vers la basse-Belgique, augmentant la probabilité qu'un chat puisse la capturer, ceci pouvant expliquer cela.



Photo : Fanny Noël.

Et voilà qu'au boulot, mon collègue me dit « ah tiens, mon frère m'a téléphoné, tu ne sais pas ce qu'il a eu pendant quelques jours dans son jardinet entouré de murs à Bruxelles ? Une bécasse ! Elle passait la journée blottie dans un coin et en soirée, elle se déplaçait pour sonder la neige et parvenir à retirer des lombrics de la pelouse. Cela a duré de jeudi à lundi (10/12). Elle est repartie, sans doute à cause du gel intense.

Deux observations quelque peu inhabituelles à la même période : est-ce un hasard ? Mais l'histoire se termine bien, la bécasse saisie par le chat a été relâchée et s'est envolée aussitôt.

Un Hibou des marais photogénique

Texte et photos de Olivier Colinet

Dimanche dernier (14/10/2012) après avoir voté, je décide d'aller faire un petit tour malgré le temps pourri... J'avais envie de me mettre un peu dans l'ambiance avant d'aller au festival nature de Namur. A 1 km de chez moi à Bioul, je commence par observer une douzaine de chevreuils, ça commence bien! Un peu plus loin, un rapace ou une poule faisane (?) décolle d'un fossé au passage de ma voiture. Je m'arrête et regarde derrière moi, il s'agissait d'un Hibou des marais!

Ce matin-là, je n'étais pas du tout équipé de matériel de camouflage! Et pourtant, pendant 3/4 d'heure, le hibou a commencé à poser dans tous les sens, à me faire des clins d'œil... Je suis descendu doucement de la voiture pour le photographier au niveau du sol, il me faisait confiance! Deux promeneurs sont passés sur un chemin 200 m plus loin, et il s'est envolé aussitôt!

Un beau cadeau de la nature!!!











Olivier Colinet





ETHOLOGIE

Une chouette erratique

De la part de Paul Michaux

Un ami ornitho a été surpris par un choc sur sa fenêtre à 22h00, le 20/09/2012, il faut que je vous dise qu'il habite à Monceau-sur-Sambre (Charleroi), pour les personnes qui ne connaissent pas, en pleine région urbaine. Il m'a apporté l'oiseau trouvé mourant au pied de sa fenêtre. Il s'agit d'une Chouette de Tengmalm, je suppose qu'elle était en migration erratique, mais qu'allait-elle faire dans cette galère !!!!





Paul Géroudet nous en apprend un peu plus : « ...on la qualifierait volontiers de sédentaire si l'on n'avait des indices de mouvements assez étendus, mais encore mal définis... des invasions se produisent certains automnes... des apparitions accidentelles... Cependant, les mœurs nocturnes et discrètes de l'espèce n'ont pas encore permis d'en savoir davantage et en particulier si ces déplacements sont entrepris surtout par des jeunes et quelles sont leurs causes. »

Prochaines formations d'Aves/Natagora

Formation Photo nature (dès mars)
 Bruxelles (le lundi soir) et Charleroi (le jeudi soir)
 Pour plus d'infos:
www.natagora.be/formationphoto

Formation Ornitho
 Namur (le lundi soir), Nivelles (le mardi soir),
 Bruxelles (le mercredi soir) et
 Couvin (le jeudi soir)
 Pour plus d'infos:
www.aves.be/formationornitho

Formation Etho
 Elle est en cours, nous n'ouvrons pas de nouvelles classes avant 2014.
 Pour plus d'info:
www.natagora.be/formationetho

Formation Entomo
 Mons (le lundi soir), Wavre (le mardi soir) et
 Neufchâteau ou sa région (le jeudi soir)
 Pour plus d'info:
www.natagora.be/formationentomo

Formation Bota
 Bruxelles (le lundi soir), Liège (le mardi soir) et Dinant (le jeudi soir)
 Pour plus d'info -- la page sera bientôt publiée -- www.natagora.be/formationbota

Ambiance automnale : migration dans la plaine de Clermont-lez-Walcourt

Texte de Bernard Hanus

Dieu que c'est fabuleux l'ornitho !

Grâce au vent soutenu de sud-est les oiseaux passaient très bas ce matin du 18/10/2012 sous une belle lumière et un ciel couvert : un régal.

De 8h30 à 13h30.

Mon poste est au pied du mont de Viscourt (point culminant à 200m d'altitude), en pleine culture. Il y ajuste un ruisseau-fossé devant moi qui traverse les champs du nord au sud. Quelques buissons le bordent avec un tout dernier « à mes pieds » avant la nudité absolue de la remontée vers le sommet du mont et puis le basculement vers l'horizon pour les migrateurs.



Un total de 14.195 oiseaux, dont pour le plus remarquable :

Alouette lulu : 157 ex. en 17 groupes, record du site.

Pigeon ramier : 5.257 ex. en 53 groupes mais très sous-estimé, le gros de la troupe passant plus à l'est, hors de ma vue !

Pinson des arbres : 6.018 ex., en continu !

Alouette des champs : 1.111 ex en petits groupes.

Pinson du nord : 97 ex. mais très sous-estimé, si on compte ne fusse que 5% cela donne 300 ex.

Et le plus surprenant pour la fin évidemment, les Mésanges :

Mésange noire : 3 ex. en 1 groupe

Mésange charbonnière : 65 ex. en 22 groupes

Mésange bleue : 327 ex. en 35 groupes.

La plupart des Mésanges arrivent en migration rampante jusqu'au dernier buisson et là toujours le même scénario : rassemblement, quelques individus regardent l'océan de labour devant eux et au bout de 30 secondes se lancent contre le vent en groupes de 2 à 35 ex. !

C'était magique.

Une Cigogne blanche tente un hivernage entre Morville et Anthée

Texte et photos : Michel Corroy

La cigogne, visiblement non baguée, se trouvait à la limite entre Morville et Anthée. Elle a été régulièrement observée entre la mi-octobre jusqu'à ce 13/12/12 le matin, d'après les observations d'un riverain, Dominique Fauvart.


- 2 observateurs la signalent sur observations.be en octobre et novembre.
- Mon collègue Jean-Yves Massart l'a observée le lundi 03/12/12 le soir.
- Je l'ai personnellement vue le 09/12/12 de 16:50 h à 17:40 h environ.


Au moins 4 observations la renseignent d'abord au sol sur une ligne de crête. Ensuite elle s'est posée sur les lampadaires voisins, le long de la N98 Dinant - Philippeville et de la route Morville - Ermeton/ Biert.

Elle venait se poser ainsi la nuit du coucher du soleil au lever du jour. Mais elle revenait par intermittence.

Vu le froid qui s'annonçait, en compagnie de Dominique Fauvart, nous avons essayé de la nourrir en posant de la nourriture près du poteau. Mais en vain. Elle a fini par s'envoler, puis revenir sur son poteau plus tard dans la nuit.

La cigogne est revenue toutes les nuits jusqu'au matin du jeudi 13. Elle est partie ce jour-là sans doute vers des cieux plus cléments. Il a gelé toute cette semaine jusque -7° environ et les journées furent ensoleillées le jeudi et vendredi.





Nichoir Insolite

Texte & photos de Patrice Wuine

Un nichoir prestigieux, installé sur le mur de la conciergerie de Val Duchesse, voilà qui ne manque pas d'humour... J'ai vu une Mésange bleue s'y engouffrer.

Message personnel : Philippe, tu sauras à l'avenir que faire des caisses de Château Carignan qui encombrant ta cave. (Réponse de l'intéressé : je ne comprends pas, je suis toujours livré en caisse de carton (véridique ☺) !)



LIENS SYMPAS

De la part de Jean Delacre :

Magnifique site sur la réserve de la Haie Gabaux avec des photos à couper le souffle...
http://www.jdelacre.be/Haie_Gabaux/Blog/Entrees/2012/9/13_LIFE-Papillons_dernieres.html

Un site hollandais fabuleux orienté sur les chants d'oiseaux du monde entier...
<https://www.birdsounds.nl/index.php?pg=checkout&lang=en>

Méduses aux BEH...

Texte & photo de Philippe Deflorenne

Le 30/08/2012, alors que nous effectuions une plongée dans les eaux de la Plate Taille (BEH), j'ai cru que Philippe, mon compagnon de palanquée, était en train de faire une narcose (ivresse des profondeurs) lors de la remontée. Ces gestes semblaient complètement désordonnés. Je m'apprêtais donc à intervenir, lorsqu'il me fait comprendre qu'il cherche après quelque chose, mais quoi ?


Nous ne tardons pas à retrouver l'objet de ses recherches... une Méduse d'eau douce (*Craspedacusta sowerbyi*). Cette méduse de petite taille (+/- 20 mm de diamètre) est peu connue en Wallonie. Elle avait déjà été renseignée aux BEH peu après la mise sous eau du site, c'est-à-dire dans les années 1980. Depuis lors c'était le calme plat. Dans la région, elle est aussi connue d'une carrière à Vodelée ou de la réserve de la Buissière, mais est sans doute à rechercher ailleurs.



Son origine est vraisemblablement asiatique. Elle aurait été disséminée par l'intervention d'un jardin botanique anglais... mais pour de plus amples informations je vous invite à consulter le très bon site de Doris (Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et de la flore Subaquatiques) :

[http://doris.ffessm.fr/fiches_liste.asp?sousgroupe_numero=26&groupe_numero=12&fichier=Faune et flore dulcicoles de France métropolitaine&numero_fichier=2](http://doris.ffessm.fr/fiches_liste.asp?sousgroupe_numero=26&groupe_numero=12&fichier=Faune%20et%20flore%20dulcicoles%20de%20France%20m%C3%A9tropolitaine&numero_fichier=2)

Ne vous effrayez pas, elle est complètement inoffensive, vous pourrez donc continuer à vous baigner dans les eaux de la Plate Taille.



Le 06/09/2012, nous repartons en plongée, armés d'un appareil photo, dans le but d'immortaliser l'instant. Au retour de plongée dans les 7 mètres de profondeur, le premier individu apparaît. Nous en verrons 6 au total.

Cette (ré-)apparition a été relatée dans de nombreux médias, la Grièche ne devait pas échapper à la règle. Bonnes recherches...



Réponse de la page 18 : Grèbe castagneux.

PLANTES RARES OU TYPIQUES DE L'ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE...

LE MILLEPERTUIS A FEUILLES DE LINAIRE (*Hypericum linariifolium* Vahl)

Texte de Olivier Roberfroid




Petigny - juillet 2012. Photo : Billy

Dix espèces du genre millepertuis sont observées en ESEM. La plupart se rencontrent régulièrement comme le perforé, l'hirsute ou l'élégant. Cependant, certaines ont disparu comme c'est le cas pour le Millepertuis des marais (*Hypericum elodes*) plus vu depuis 1930 ou restent rares et localisées tel le Millepertuis des montagnes (*H. montanum*), espèce des lisières calcicoles.

Il y a une vingtaine d'années, une station d'un millepertuis inconnu en Belgique a été découverte à Petigny. Sur un affleurement de roches acides et bien exposé au-dessus du Ri de Pernelle, poussent des centaines de pieds (en 2012) du Millepertuis à feuilles de linaires. Cette espèce se distingue par sa tige ronde sans ligne saillante. Celle-ci porte de petites feuilles lancéolées à bords enroulés et des pétales jaune-rougeâtre bordés comme les sépales, de glandes sombres bien visibles. Elle fleurit en juin-juillet.

Cette espèce qui ne dépasse pas 40 cm de hauteur, est une plante thermophile des landes, des éboulis et des rochers secs et acides.



Répartition en Wallonie du Millepertuis à feuilles de linaires

(<http://biodiversite.wallonie.be/>).

Sa carte de répartition montre une aire de distribution restreinte au SO de l'Europe. Elle atteint en ESEM sa limite nord-orientale. Elle vient d'être découverte également à Le Mesnil et il en existe une station à Monthermé dans les Ardennes françaises. Ces 3 localités sont isolées de plus de 200 km des premières stations vers

le sud situées dans le département de l'Yonne. Extension récente de la répartition de la plante ou le Millepertuis à feuilles de linaires vivait-il incognito depuis longtemps dans nos contrées ?

En tout cas, ce millepertuis est un fleuron de la flore de l'ESEM et ses deux seules stations connues en Wallonie doivent être non seulement protégées mais également maintenues dégagées par une gestion annuelle afin d'éviter l'occupation des sites par les genêts par exemple. C'est déjà le cas à Petigny. La station au Mesnil, qui accueille aussi un lot de lichens terricoles intéressants, se situe en zone soumise et devrait être maintenue ouverte, notre millepertuis étant menacé d'étouffement par les ligneux et les ronces qui recolonisent le site.

Participez à l'Atlas de la Flore de Wallonie 2010
Contactez Olivier Roberfroid o.roberfroid@fefem.com

NOUVEAU : LE BLOG DU CREAVES DE VIRELLES

Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l'Etat Sauvage

<http://creavesvirelles.blogspot.be>



Notre mission : Accueillir, soigner, relâcher.
0476/94.22.25

HUMOUR



Pluriel des noms composés: un garde-boeuf, des... garde-vaches!
Photo de Marc Fasol. Septembre 2012.